

レジメン名 DBd療法(sc. 1-3サイクル目) 対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容																																																																																			
<p>★DBd療法(sc. 1-3サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ(ダラツムマブ)</td> <td>1800mg</td> <td>day1, 8, 15</td> </tr> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 4, 8, 11</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,2,4,5,8,9,11,12, 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 75歳超える又は過小体重(BMI 18.5kg/m²未満)の患者はレナデックスを週20mgへの減量可 ・ダラキューロ配合皮下注1瓶15mL中にダラツムマブ1800mg含む</p>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1, 8, 15	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11	レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12, 15	<p>投与サイクル数 ★最大3サイクル</p> <p>総投与時間 皮下注射</p> <p>血管外漏出リスク</p> <p>調製時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p>	<p>day1,8</p> <p>内服**</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200m</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300m</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200m	1錠	アセトアミノフェン錠300m	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		ダラキューロ	1800mg	腹部に皮下注		ボルテゾミブ	mg	生理食塩液	ml	腹部に皮下注																																															
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																			
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1, 8, 15																																																																																			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11																																																																																			
レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12, 15																																																																																			
レナデックス	錠																																																																																				
分1朝																																																																																					
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																																				
アセトアミノフェン錠200m	1錠																																																																																				
アセトアミノフェン錠300m	1錠																																																																																				
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																																				
分1朝																																																																																					
ダラキューロ	1800mg																																																																																				
腹部に皮下注																																																																																					
ボルテゾミブ	mg																																																																																				
生理食塩液	ml																																																																																				
腹部に皮下注																																																																																					
<p>投与スケジュール</p> <p>★DBd療法(sc. 1-3サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>...</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス*</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	ダラキューロ	●							●							●			ボルテゾミブ	●		●					●			●							レナデックス*	●	●	●	●				●	●		●	●			●			<p><ダラキューロ> * *レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射針をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p> <p><ボルテゾミブ> ・腹部に皮下注射する。 ・投与部位は前回と同じ位置への投与を避ける。 ・溶解後8時間以内に使用すること。 ・腹部皮下に投与する。 ・上記2剤は同一部位に投与しない。</p>	<p>day4, 11</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		ボルテゾミブ	mg	生理食塩液	ml	腹部に皮下注	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21																																																																				
ダラキューロ	●							●							●																																																																						
ボルテゾミブ	●		●					●			●																																																																										
レナデックス*	●	●	●	●				●	●		●	●			●																																																																						
レナデックス	錠																																																																																				
分1朝																																																																																					
ボルテゾミブ	mg																																																																																				
生理食塩液	ml																																																																																				
腹部に皮下注																																																																																					
<p>備考欄</p> <p>ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。</p>		<p>day2,5,9,12</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		<p>day15</p> <p>内服**</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200mg	1錠	アセトアミノフェン錠300mg	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		ダラキューロ	1800mg	腹部に皮下注																																																													
レナデックス	錠																																																																																				
分1朝																																																																																					
レナデックス	錠																																																																																				
分1朝																																																																																					
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																																				
アセトアミノフェン錠200mg	1錠																																																																																				
アセトアミノフェン錠300mg	1錠																																																																																				
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																																				
分1朝																																																																																					
ダラキューロ	1800mg																																																																																				
腹部に皮下注																																																																																					

レジメン名 DBd療法(sc. 4-8サイクル目) 対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi			投与 サイクル数	★最大5サイクル	治療内容																																																																																																					
<p>★DBd療法(sc. 4-8サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ(ダラツムマブ)</td> <td>1800mg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 4, 8, 11</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,2,4,5,8,9,11,12</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 75歳超える又は過小体重(BMI 18.5kg/m²未満)の患者はレナデックスを週20mgへの減量可 ・ダラキューロ配合皮下注1瓶15mL中にダラツムマブ1800mg含む</p>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11	レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12	総投与時間	皮下注射	day1	day4, 8, 11																																																																																								
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																								
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1																																																																																																								
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11																																																																																																								
レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12																																																																																																								
<p>投与スケジュール</p> <p>★DBd療法(sc. 4-8サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>...</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス*</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	ダラキューロ	●																	ボルテゾミブ	●			●				●			●							レナデックス*	●	●		●	●			●	●		●	●						血管外漏出 リスク		<p>内服**</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200m</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300m</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200m	1錠	アセトアミノフェン錠300m	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		ダラキューロ	1800mg	腹部に皮下注		ボルテゾミブ	mg	生理食塩液	ml	腹部に皮下注		<p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21																																																																																									
ダラキューロ	●																																																																																																									
ボルテゾミブ	●			●				●			●																																																																																															
レナデックス*	●	●		●	●			●	●		●	●																																																																																														
レナデックス	錠																																																																																																									
分1朝																																																																																																										
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																																																									
アセトアミノフェン錠200m	1錠																																																																																																									
アセトアミノフェン錠300m	1錠																																																																																																									
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																																																									
分1朝																																																																																																										
ダラキューロ	1800mg																																																																																																									
腹部に皮下注																																																																																																										
ボルテゾミブ	mg																																																																																																									
生理食塩液	ml																																																																																																									
腹部に皮下注																																																																																																										
レナデックス	錠																																																																																																									
分1朝																																																																																																										
<p>調製時の 注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p>			<p>調製時の 注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p> <p><ボルテゾミブ> ・腹部に皮下注射する。 ・投与部位は前回と同じ位置への投与を避ける。 ・溶解後8時間以内に使用すること。 ・腹部皮下に投与する。 ・上記2剤は同一部位に投与しない。</p>	<p>day2、5、9、12</p>																																																																																																						
<p>投与時の 注意事項</p>			<p>投与時の 注意事項</p>																																																																																																							
<p>備考欄</p>			<p>備考欄</p> <p>ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。</p>																																																																																																							

レジメン名

DBd療法(sc. 9サイクル目以降)

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi			治療内容																																																																																
<p>★DBd療法(sc. 9サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ(ダラツムマブ)</td> <td>1800mg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>20mg/body</td> <td>day1</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 75歳を超える又は過小体重(BMI 18.5kg/m²未満)の患者はレナデックスを週20mgへの減量可</p> <p>・ダラキューロ配合皮下注1瓶15mL中にダラツムマブ1800mg含む</p>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1	レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1	<p>投与サイクル数</p> <p>★PDまで</p>	<p>day1</p>																																																																						
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																	
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1																																																																																	
レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1																																																																																	
<p>投与スケジュール</p> <p>★DBd療法(sc. 9サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス*</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				1	28	ダラキューロ	●																			レナデックス*	●																			<p>総投与時間</p> <p>皮下注射</p>	<p>内服**</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		レナデックス	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200mg	1錠	アセトアミノフェン錠300mg	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		ダラキューロ	1800mg	腹部に皮下注	
	1	28																																																																
ダラキューロ	●																																																																																		
レナデックス*	●																																																																																		
レナデックス	錠																																																																																		
分1朝																																																																																			
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																																		
アセトアミノフェン錠200mg	1錠																																																																																		
アセトアミノフェン錠300mg	1錠																																																																																		
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																																		
分1朝																																																																																			
ダラキューロ	1800mg																																																																																		
腹部に皮下注																																																																																			
<p>血管外漏出リスク</p>			<p>血管外漏出リスク</p>																																																																																
<p>調製時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p>			<p>投与時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> **レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用前に皮下注射針をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p>																																																																																
<p>備考欄</p>			<p>ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。</p>																																																																																