

レジメン名 DKd療法(sc. 75歳未満)(1サイクル目)

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi				治療内容	
★DKd療法(75歳未満)(1サイクル目)				day 1、8、15	day 2、9、16
薬品名(成分名)	投与量	投与日		内服*	内服
ダラキューロ	1800mg	day1, 8, 15, 22		レナデックス 錠 分1朝	レナデックス 錠 分1朝
カイプロリス(カルフィルゾミブ)	20mg/m ²	day1,2		レスタミンコーワ錠10mg 3錠 アセトアミノフェン錠200mg 1錠 アセトアミノフェン錠300mg 1錠 モンテルカスト 10mg 1錠 分1朝	点滴 ①5%ブドウ糖液 100 ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ②カイプロリス mg 5%ブドウ糖液 50 ml 点滴、30分
カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	day8,9,15,16			
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,2,8,9,15,16			
レナデックス(デキサメタゾン)	40mg/body	day22			
投与スケジュール				点滴	day 22
★DKd療法(1サイクル目)				①5%ブドウ糖液 100 ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ②カイプロリス mg 5%ブドウ糖液 50 ml 点滴、30分	内服*
ダラキューロ	●		●		レナデックス 錠 分1朝
カイプロリス(20mg/m ²)	●	●			* レスタミンコーワ錠10mg 3錠 アセトアミノフェン錠200mg 1錠 アセトアミノフェン錠300mg 1錠 モンテルカスト 10mg 1錠 分1朝
カイプロリス(56mg/m ²)			●	●	
レナデックス(20mg/body)	●	●	●	●	
レナデックス(40mg/body)				●	皮下注射 ①ダラキューロ 1800mg 腹部に皮下注
調製時の注意事項				皮下注射	
<p><ダラキューロ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30°Cに戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。 				③ダラキューロ 1800mg 腹部に皮下注	
投与時の注意事項					
<p><ダラキューロ></p> <ul style="list-style-type: none"> *レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。 					
備考欄					
カイプロリス: 体表面積が2.2m ² を超える患者では、体表面積2.2m ² として投与量を算出すること					

レジメン名 DKd療法(sc.75歳未満)(3-6サイクル目) 対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi				治療内容																																																																																																							
<p>★DKd療法(sc.75歳未満)(3-6サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> <td>day1,15</td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(カルフィルゾミブ)</td> <td>56mg/m²</td> <td>day1,2,8,9,15,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,2,8,9,15,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>40mg/body</td> <td>day22</td> </tr> </tbody> </table>				薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ	1800mg	day1,15	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,2,8,9,15,16	レナデックス(デキサメタゾン)	40mg/body	day22	<p>投与 サイクル数</p>	<p>★最大4サイクル</p>	<p>day 1,15</p>	<p>day 2,8,9,16</p>																																																																																					
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																									
ダラキューロ	1800mg	day1,15																																																																																																									
カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16																																																																																																									
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,2,8,9,15,16																																																																																																									
レナデックス(デキサメタゾン)	40mg/body	day22																																																																																																									
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>★DKd療法(sc.75歳未満 3-6サイクル目)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(56mg/m²)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(20mg/body)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(40mg/body)</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				★DKd療法(sc.75歳未満 3-6サイクル目)	1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28	ダラキューロ	●							●						カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●					レナデックス(20mg/body)	●	●			●	●		●	●					レナデックス(40mg/body)											●			<p>総投与時間</p> <p>day1,15 1時間 day2,8,9,16 40分</p>	<p>血管外漏出リスク</p> <p>カイプロリス (カルフィゾミブ): 炎症性抗がん剤</p>	<p>内服*</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>*</p> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200mg	1錠	アセトアミノフェン錠300mg	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		<p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>①5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②カイプロリス 56mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		①5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		②カイプロリス 56mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分	
★DKd療法(sc.75歳未満 3-6サイクル目)	1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28																																																																																														
ダラキューロ	●							●																																																																																																			
カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●																																																																																																		
レナデックス(20mg/body)	●	●			●	●		●	●																																																																																																		
レナデックス(40mg/body)											●																																																																																																
レナデックス	錠																																																																																																										
分1朝																																																																																																											
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																																																										
アセトアミノフェン錠200mg	1錠																																																																																																										
アセトアミノフェン錠300mg	1錠																																																																																																										
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																																																										
分1朝																																																																																																											
レナデックス	錠																																																																																																										
分1朝																																																																																																											
①5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																											
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																											
↓																																																																																																											
②カイプロリス 56mg																																																																																																											
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																											
点滴、30分																																																																																																											
				<p>調製時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30°Cに戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p>	<p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>①5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②カイプロリス 56mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table>	①5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		②カイプロリス 56mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分		<p>day 22</p>																																																																																									
①5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																											
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																											
↓																																																																																																											
②カイプロリス 56mg																																																																																																											
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																											
点滴、30分																																																																																																											
				<p>投与時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> *レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用前に皮下注射をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p>	<p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>③ダラキューロ 1800mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	③ダラキューロ 1800mg		腹部に皮下注		<p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝																																																																																														
③ダラキューロ 1800mg																																																																																																											
腹部に皮下注																																																																																																											
レナデックス	錠																																																																																																										
分1朝																																																																																																											
				<p>備考欄</p> <p>カイプロリス:体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積2.2m²として投与量を算出すること</p>																																																																																																							

レジメン名 DKd療法(sc.75歳未満)(7サイクル目以降)

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容																																																																							
<p>★DKd療法(sc.75歳未満)(7サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(カルフィルゾミブ)</td> <td>56mg/m²</td> <td>day1,2,8,9,15,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,2,8,9,15,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>40mg/body</td> <td>day22</td> </tr> </tbody> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ	1800mg	day1	カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,2,8,9,15,16	レナデックス(デキサメタゾン)	40mg/body	day22	<p>投与サイクル数</p> <p>★PDまで</p>	<p>day 1</p> <p>day 2,8,9,15,16</p>																																																							
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																							
ダラキューロ	1800mg	day1																																																																							
カイプロリス(カルフィルゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16																																																																							
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,2,8,9,15,16																																																																							
レナデックス(デキサメタゾン)	40mg/body	day22																																																																							
<p>投与スケジュール</p> <p>★DKd療法(sc.75歳未満 7サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(56mg/m²)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(20mg/body)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(40mg/body)</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28	ダラキューロ	●													カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●					レナデックス(20mg/body)	●	●			●	●		●	●					レナデックス(40mg/body)											●			<p>総投与時間</p> <p>day1 1時間 day2,8,9,15,16 40分 day22 皮下注</p>	<p>day 2,8,9,15,16</p> <p>内服</p> <p>レナデックス 錠 分1朝</p> <p>点滴</p> <p>① 5%ブドウ糖液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② カイプロリス mg 5%ブドウ糖液 50 ml 点滴、30分</p>
	1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28																																																												
ダラキューロ	●																																																																								
カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●																																																																
レナデックス(20mg/body)	●	●			●	●		●	●																																																																
レナデックス(40mg/body)											●																																																														
<p>血管外漏出リスク</p> <p>カイプロリス(カルフィルゾミブ): 炎症性抗がん剤</p>		<p>調製時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p>	<p>day 22</p> <p>内服</p> <p>レナデックス 錠 分1朝</p>																																																																						
<p>投与時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> *レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用前に皮下注射をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p>		<p>点滴</p> <p>① 5%ブドウ糖液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② カイプロリス mg 5%ブドウ糖液 50 ml 点滴、30分</p> <p>皮下注射</p> <p>③ ダラキューロ 1800mg 腹部に皮下注</p>																																																																							
<p>備考欄</p> <p>カイプロリス: 体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積2.2m²として投与量を算出すること</p>																																																																									

レジメン名 DKd療法(sc.75歳以上)(2サイクル目)

対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi				治療内容																																																										
★DKd療法(sc.75歳以上)(2サイクル目) <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(カルフィゾミブ)</td> <td>56mg/m²</td> <td>day1,2,8,9,15,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,8,15,22</td> </tr> </tbody> </table>				薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ	1800mg	day1, 8, 15, 22	カイプロリス(カルフィゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,8,15,22	投与サイクル数 総投与時間 血管外漏出リスク	★最大1サイクル day1,8,15 1時間 day2,9,16 40分 day22 皮下注 カイプロリス(カルフィゾミブ): 炎症性抗がん剤	day 1、8、15 内服* レナデックス 錠 分1朝 * レスタミンコーワ錠10mg 3錠 アセトアミノフェン錠200mg 1錠 アセトアミノフェン錠300mg 1錠 モンテルカスト 10mg 1錠 分1朝 点滴 ① 5%ブドウ糖液 100 ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ② カイプロリス mg 5%ブドウ糖液 50 ml 点滴、30分 皮下注射 ③ ダラキューロ 1800mg 腹部に皮下注	day 2、9、16 点滴 ① 5%ブドウ糖液 100 ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ② カイプロリス mg 5%ブドウ糖液 50 ml 点滴、30分 day 22 内服* レナデックス 錠 分1朝 * レスタミンコーワ錠10mg 3錠 アセトアミノフェン錠200mg 1錠 アセトアミノフェン錠300mg 1錠 モンテルカスト 10mg 1錠 分1朝 皮下注射 ① ダラキューロ 1800mg 腹部に皮下注																																											
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																												
ダラキューロ	1800mg	day1, 8, 15, 22																																																												
カイプロリス(カルフィゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16																																																												
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,8,15,22																																																												
投与スケジュール ★DKd療法(sc.75歳以上 2サイクル目) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(56mg/m²)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(20mg/body)</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28	ダラキューロ	●				●			●			●			カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●					レナデックス(20mg/body)	●				●			●			●			調製時の注意事項 投与時の注意事項	<ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。 <ダラキューロ> *レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。	備考欄 カイプロリス:体表面積が2.2m ² を超える患者では、体表面積2.2m ² として投与量を算出すること
	1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28																																																	
ダラキューロ	●				●			●			●																																																			
カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●																																																					
レナデックス(20mg/body)	●				●			●			●																																																			

レジメン名 DKd療法(sc.75歳以上)(3-6サイクル目) 対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容																																																																																																																																																					
<p>★DKd療法(sc.75歳以上)(3-6サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> <td>day1,15</td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(カルフィゾミブ)</td> <td>56mg/m²</td> <td>day1,2,8,9,15,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>12mg/body</td> <td>day8</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>8mg/body</td> <td>day9</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,15,22</td> </tr> </tbody> </table>			投与量	投与日	ダラキューロ	1800mg	day1,15	カイプロリス(カルフィゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	レナデックス(デキサメタゾン)	12mg/body	day8	レナデックス(デキサメタゾン)	8mg/body	day9	レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,15,22	<p>投与サイクル数</p> <p>★最大4サイクル</p>	<p>day 1,15</p> <p>day 2,16</p>																																																																																																																																		
	投与量	投与日																																																																																																																																																					
ダラキューロ	1800mg	day1,15																																																																																																																																																					
カイプロリス(カルフィゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16																																																																																																																																																					
レナデックス(デキサメタゾン)	12mg/body	day8																																																																																																																																																					
レナデックス(デキサメタゾン)	8mg/body	day9																																																																																																																																																					
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,15,22																																																																																																																																																					
<p>投与スケジュール</p> <p>★DKd療法(sc.75歳以上)3-6サイクル目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(56mg/m²)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(12mg/body)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(8mg/body)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(20mg/body)</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28	ダラキューロ	●							●						カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●					レナデックス(12mg/body)					●									レナデックス(8mg/body)					●									レナデックス(20mg/body)	●							●			●			<p>総投与時間</p> <p>day1,15 1時間 day2,8,9,16 40分</p>	<p>血管外漏出リスク</p> <p>カイプロリス(カルフィゾミブ): 炎症性抗がん剤</p>	<p>day 1,15</p> <p>内服*</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>*</p> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>① 5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② カイプロリス 50 mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>③ ダラキューロ 1800mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200mg	1錠	アセトアミノフェン錠300mg	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		① 5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		② カイプロリス 50 mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分		③ ダラキューロ 1800mg		腹部に皮下注		<p>day 2,16</p> <p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>① 5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② カイプロリス 50 mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table> <p>day 8,9</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス 錠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>① 5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② カイプロリス 50 mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table> <p>day 22</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス 錠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	① 5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		② カイプロリス 50 mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分		レナデックス 錠		分1朝		① 5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		② カイプロリス 50 mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分		レナデックス 錠		分1朝	
	1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28																																																																																																																																										
ダラキューロ	●							●																																																																																																																																															
カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●																																																																																																																																														
レナデックス(12mg/body)					●																																																																																																																																																		
レナデックス(8mg/body)					●																																																																																																																																																		
レナデックス(20mg/body)	●							●			●																																																																																																																																												
レナデックス	錠																																																																																																																																																						
分1朝																																																																																																																																																							
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																																																																																																						
アセトアミノフェン錠200mg	1錠																																																																																																																																																						
アセトアミノフェン錠300mg	1錠																																																																																																																																																						
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																																																																																																						
分1朝																																																																																																																																																							
① 5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																																																																							
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																																																							
↓																																																																																																																																																							
② カイプロリス 50 mg																																																																																																																																																							
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																																																																							
点滴、30分																																																																																																																																																							
③ ダラキューロ 1800mg																																																																																																																																																							
腹部に皮下注																																																																																																																																																							
① 5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																																																																							
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																																																							
↓																																																																																																																																																							
② カイプロリス 50 mg																																																																																																																																																							
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																																																																							
点滴、30分																																																																																																																																																							
レナデックス 錠																																																																																																																																																							
分1朝																																																																																																																																																							
① 5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																																																																							
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																																																							
↓																																																																																																																																																							
② カイプロリス 50 mg																																																																																																																																																							
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																																																																							
点滴、30分																																																																																																																																																							
レナデックス 錠																																																																																																																																																							
分1朝																																																																																																																																																							
<p>調製時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p>		<p>投与時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> *レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射針をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p>																																																																																																																																																					
<p>備考欄</p> <p>カイプロリス:体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積2.2m²として投与量を算出すること</p>																																																																																																																																																							

レジメン名 DKd療法(sc. 75歳以上)(7サイクル目以降) 対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容																																																																																																						
<p>★DKd療法(sc. 75歳以上)(7サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(カルフィゾミブ)</td> <td>56mg/m²</td> <td>day1,2,8,9,15,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>12mg/body</td> <td>day8,15</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>8mg/body</td> <td>day9,16</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,22</td> </tr> </tbody> </table>			投与量	投与日	ダラキューロ	1800mg	day1	カイプロリス(カルフィゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	レナデックス(デキサメタゾン)	12mg/body	day8,15	レナデックス(デキサメタゾン)	8mg/body	day9,16	レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,22	<p>投与サイクル数</p>	<p>★PDまで</p>	<p>day 1</p> <p>内服*</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>*</p> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200mg	1錠	アセトアミノフェン錠300mg	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		<p>day 2</p> <p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>① 5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② カイプロリス mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table>	① 5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		② カイプロリス mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分																																																								
	投与量	投与日																																																																																																						
ダラキューロ	1800mg	day1																																																																																																						
カイプロリス(カルフィゾミブ)	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16																																																																																																						
レナデックス(デキサメタゾン)	12mg/body	day8,15																																																																																																						
レナデックス(デキサメタゾン)	8mg/body	day9,16																																																																																																						
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,22																																																																																																						
レナデックス	錠																																																																																																							
分1朝																																																																																																								
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																																																							
アセトアミノフェン錠200mg	1錠																																																																																																							
アセトアミノフェン錠300mg	1錠																																																																																																							
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																																																							
分1朝																																																																																																								
① 5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																								
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																								
↓																																																																																																								
② カイプロリス mg																																																																																																								
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																								
点滴、30分																																																																																																								
<p>投与スケジュール</p> <p>★DKd療法(sc. 75歳以上7サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カイプロリス(56mg/m²)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(12mg/body)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(8mg/body)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス(20mg/body)</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28	ダラキューロ	●													カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●					レナデックス(12mg/body)					●			●						レナデックス(8mg/body)						●		●						レナデックス(20mg/body)	●										●			<p>総投与時間</p> <p>day1 1時間 day2,8,9,15,16 40分</p>	<p>血管外漏出リスク</p> <p>カイプロリス(カルフィゾミブ): 炎症性抗がん剤</p>	<p>day 8,9,15,16</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>① 5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② カイプロリス mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝		① 5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		② カイプロリス mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分	
	1	2	3	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28																																																																																											
ダラキューロ	●																																																																																																							
カイプロリス(56mg/m ²)	●	●			●	●		●	●																																																																																															
レナデックス(12mg/body)					●			●																																																																																																
レナデックス(8mg/body)						●		●																																																																																																
レナデックス(20mg/body)	●										●																																																																																													
レナデックス	錠																																																																																																							
分1朝																																																																																																								
① 5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																								
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																								
↓																																																																																																								
② カイプロリス mg																																																																																																								
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																								
点滴、30分																																																																																																								
		<p>調製時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30°Cに戻した後に使用する。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p>	<p>点滴</p> <table border="1"> <tr> <td>① 5%ブドウ糖液 100 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② カイプロリス mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5%ブドウ糖液 50 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> </table>	① 5%ブドウ糖液 100 ml		ルート確保・フラッシュ用		↓		② カイプロリス mg		5%ブドウ糖液 50 ml		点滴、30分		<p>day 22</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	錠	分1朝																																																																																					
① 5%ブドウ糖液 100 ml																																																																																																								
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																								
↓																																																																																																								
② カイプロリス mg																																																																																																								
5%ブドウ糖液 50 ml																																																																																																								
点滴、30分																																																																																																								
レナデックス	錠																																																																																																							
分1朝																																																																																																								
		<p>投与時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> *レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射針をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p>	<p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>③ ダラキューロ 1800mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	③ ダラキューロ 1800mg		腹部に皮下注																																																																																																		
③ ダラキューロ 1800mg																																																																																																								
腹部に皮下注																																																																																																								
		<p>備考欄</p> <p>カイプロリス: 体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積2.2m²として投与量を算出すること</p>																																																																																																						