

がん化学療法指示書

登録番号 347

作成日 2022/9/14

レジメン名	ニボルマブ療法(4週毎)
診療科・対象疾患	(泌)尿路上皮癌における術後補助療法
投与間隔	4週毎
投与サイクル数	最長12ヶ月まで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール															
							day1													day28		
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100ml	任意	ルート確保用	●															
		Rp2	癌	オブジーボ(ニボルマブ)	480mg	30分	点滴静注メイン	●														
				生理食塩液	100ml		総量100mLにする															
		Rp3		生理食塩液	50ml	15分	フラッシュ用	●														
その他必要薬剤																						
総投与時間	45分																					
血管外漏出リスク	オブジーボ(ニボルマブ):非壊死性抗がん薬																					
投与時の注意事項	オブジーボ(ニボルマブ):フィルター付きルートが必要 シリコン製のCVポートは蛋白質の凝集を認めるため、使用を避ける。																					
備考欄	Infusion Reaction Grade2の場合、オブジーボ(ニボルマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠																					