

レジメン名

HyperCVAD療法

対象疾患

非ホジキリンパ腫

ChemoNavi		治療内容																																																																																										
		day1	day2,3	day4																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>300mg/m² × 2</td> <td>day 1 - 3</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>1.4mg/m² (max2mg/body)</td> <td>day 4, day11</td> </tr> <tr> <td>ドキソルピシン</td> <td>25mg/m²/12h × 2</td> <td>day 4</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサート)</td> <td>40mg/body</td> <td>day 1 - 4, day11-14</td> </tr> </tbody> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	エンドキサン(シクロホスファミド)	300mg/m ² × 2	day 1 - 3	オンコピン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ² (max2mg/body)	day 4, day11	ドキソルピシン	25mg/m ² /12h × 2	day 4	デキサート(デキサート)	40mg/body	day 1 - 4, day11-14																																																																												
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																										
エンドキサン(シクロホスファミド)	300mg/m ² × 2	day 1 - 3																																																																																										
オンコピン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ² (max2mg/body)	day 4, day11																																																																																										
ドキソルピシン	25mg/m ² /12h × 2	day 4																																																																																										
デキサート(デキサート)	40mg/body	day 1 - 4, day11-14																																																																																										
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="14">HyperCVAD</th> </tr> <tr> <th>HyperCVAD</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>.....</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>.....</th> <th>21</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エンドキサン x2</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキソルピシン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル 21日</p>		HyperCVAD														HyperCVAD	1	2	3	4	11	12	13	14	21			エンドキサン x2	●	●	●												オンコピン				●											ドキソルピシン				●											デキサート	●	●	●	●		●		●	●	●							
HyperCVAD																																																																																												
HyperCVAD	1	2	3	4	11	12	13	14	21																																																																																	
エンドキサン x2	●	●	●																																																																																									
オンコピン				●																																																																																								
ドキソルピシン				●																																																																																								
デキサート	●	●	●	●		●		●	●	●																																																																																		
投与サイクル数	PD(上限10サイクルまで)																																																																																											
総投与時間	day1:5時間55分、day2,3:5時間50分 day4:14時間30分、day5:10時間 day11:45分、day12,13,14:30分																																																																																											
血管外漏出リスク	エンドキサン:炎症性抗がん剤 オンコピン:壊死性抗がん剤 ドキソルピシン:壊死性抗がん剤																																																																																											
投与時の注意事項																																																																																												
備考欄																																																																																												
		<p>day1</p> <p>① 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② パロノセトロン注 1袋 9:30 全開投与</p> <p>↓</p> <p>③ デキサート(6.6) 39.6 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分 9:30 - 10:00</p> <p>↓</p> <p>④ エンドキサン mg YDソリタT1 500 ml 点滴、2時間 10:00 - 12:00</p> <p>↓</p> <p>⑤ 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>⑥ エンドキサン mg YDソリタT1 500 ml 点滴、2時間 20:00 - 22:00</p>	<p>day2,3</p> <p>① 生理食塩 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② デキサート(6.6) 39.6 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分 9:30 - 10:00</p> <p>↓</p> <p>③ エンドキサン mg YDソリタT1 500 ml 点滴、2時間 10:00 - 12:00</p> <p>↓</p> <p>④ 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>⑤ エンドキサン mg YDソリタT1 500 ml 点滴、2時間 20:00 - 22:00</p>	<p>day4</p> <p>① 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② デキサート(6.6) 39.6 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分 9:30 - 10:00</p> <p>↓</p> <p>③ グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>④ オンコピン mg 生理食塩液 50 ml 全開投与</p> <p>↓</p> <p>⑤ ドキソルピシン mg YDソリタT1 500 ml 点滴、12時間 10:00 - 22:00</p> <p>↓</p> <p>⑥ ドキソルピシン mg YDソリタT1 500 ml 点滴、12時間 22:00 - 翌10:00</p> <p>↓</p> <p>⑦ 生理食塩液 50 ml ルートフラッシュ用</p>																																																																																								
		<p>day11</p> <p>① 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② オンコピン mg 生理食塩液 50 ml 10:00 全開投与</p> <p>↓</p> <p>③ デキサート(6.6) 39.6 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分 10:00 - 10:30</p>	<p>day12,13,14</p> <p>デキサート(6.6) 39.6 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分 10:00 - 10:30</p>																																																																																									

