登録番号　351　作成日　2022年10月12日

大阪鉄道病院

レジメン名　MA療法

対象疾患　非ホジキンリンパ腫

ChemoNavi

薬品名(成分名)	投与量	投与日
メソトレキセート(メトトレキセート)	1g/㎡/24h (0.2g/㎡/2h 0.8g/㎡/22h)	day1～2
シタラビン	2g/㎡/2h×2	day2、3

投与サイクル数	PDまで
総投与時間	day1 18時間 day2-4 24時間
血管外漏出リスク	メソトレキセート (メトトレキセート) :非壊死 抗がん剤 シタラビン :非壊死性 抗がん剤
投与時の注意事項	・メソトレキセート投与終了12時間後にレボホリナートを7.5mg投与、以後6時間ごとにレボホリナート7.5mgを7回投与する。 ・レボホリナートの前後生理食塩液でフラッシュする。
備考欄	・メソトレキセート投与終了後、24時間後、48時間後にメソトレキセート血中濃度測定する。 ・尿のアルカリ化の確認 day1-5　10:00 尿pH7以上であること確認する。 尿pH7未満ならメイロン(20)1A追加
その他薬剤	・尿のアルカリ化のため、ダイアモックス錠250mg、2錠分2朝夕食後、day1-4内服 ・シタラビンの結膜炎予防のため、day2-8までフルメトロン点眼実施

投与スケジュール

MA療法												
治療日	1	2	3	4								21
メソトレキセート	▮	▮	▮	▮								
シタラビン		●	●									

治療内容

day1

①KN3号液　500mL
メイロン　40mL
点滴　6:00～12:00　6時間

別ルートから投与

②生理食塩液　100mL
10:00～　ルート確保・フラッシュ用

③ソル・メドロール　250mg
生理食塩液　20mL
10:00～　注射

④グラニセトロン注　1袋
(3mg/50mL)
10:00～全開

⑤メソトレキセート　mg
5%ブドウ糖液　500mL
点滴　10:00～12:00　2時間

⑥YDソリタT1　500mL
メイロン　40mL
点滴　12:00～18:00　6時間

別ルートから投与

⑦メソトレキセート　mg
5%ブドウ糖液　500mL
点滴　12:00～24:00　12時間

⑧KN3号液　500ml
メイロン　40ml
点滴　18:00～24:00　6時間

day2

①KN3号液　500ml
メイロン　40ml
点滴　0:00～12:00　12時間

別ルートから投与

⑤メソトレキセート　mg
5%ブドウ糖液　500mL
点滴　0:00～10:00　10時間

③ソル・メドロール　125mg
生理食塩液　20mL
10:00～　注射

④グラニセトロン注　1袋
(3mg/50mL)
10:00～全開

⑤シタラビン　mg
5%ブドウ糖液　400mL
点滴　10:00～12:00　2時間

⑥生理食塩液　100mL
12:00～　ルートフラッシュ用

⑦KN3号液　500ml
メイロン　40ml
点滴　12:00～24:00　12時間

⑧レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　22:00～　注射

別ルートから投与

⑨生理食塩液　100mL
22:00～　ルートキープ・フラッシュ用口

⑩ソル・メドロール　125mg
生理食塩液　20mL
22:00～　注射

⑪グラニセトロン注　1袋
(3mg/50mL)
22:00～全開

⑫シタラビン　mg
5%ブドウ糖液　400mL
点滴　22:00～24:00　2時間

day3

①KN3号液　500ml
メイロン　40ml
点滴　0:00～12:00

②レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　4:00～　注射

③レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　10:00～　注射

別ルートから投与

④生理食塩液　100mL
10:00～　ルートキープ・フラッシュ用口

⑤ソル・メドロール　125mg
生理食塩液　20mL
10:00～　注射

⑥グラニセトロン注　1袋
(3mg/50mL)
10:00～全開

⑦シタラビン　mg
5%ブドウ糖液　400mL
点滴　10:00～12:00　2時間

⑧KN3号液　500ml
メイロン　40ml
点滴　12:00～24:00　12時間

⑨レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　16:00～　注射

⑩レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　22:00～　注射

別ルートから投与

⑪生理食塩液　100mL
22:00～　ルートキープ・フラッシュ用口

⑫ソル・メドロール　125mg
生理食塩液　20mL
22:00～　注射

⑬グラニセトロン注　1袋
(3mg/50mL)
22:00～全開

⑭シタラビン　mg
5%ブドウ糖液　400mL
点滴　22:00～24:00　2時間

day4

①KN3号液　500ml
メイロン　40ml
点滴　0:00～12:00　12時間

②レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　4:00～　注射

③レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　10:00～　注射

④KN3号液　500ml
メイロン　40ml
点滴　12:00～24:00　12時間

⑤レボホリナート　7.5mg
5%ブドウ糖液　6mL
側　16:00～　注射

day1	day2	day3	day4
	採血 MTX終了濃度 10:00 (基準値:≦20μmol/L)	採血 MTX終了24時間後濃度 10:00 (基準値:1μmol/L)	採血 MTX終了48時間後濃度 10:00 (基準値:≦0.1μmol/L)

day1-5　尿pH測定実施　10:00