

レジメン名 モガムリズマブ+CHOP療法 対象疾患 ATL(成人T細胞性白血病リンパ腫)

| ChemoNavi   |                                     |         | 投与  | 治療内容           |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---|-------------------------------------|---------|-----|----------------|--------|-------|----------------|-------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------|-------------------|----------------------|-------|---------------|------------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボテリジオ(モガムリズマブ)</td> <td>1mg/kg</td> <td>day 1</td> </tr> <tr> <td>オンコビン(ビンクリスチン)</td> <td>1.4mg/m<sup>2</sup>(max 2mg/body)</td> <td>day 2</td> </tr> <tr> <td>ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)</td> <td>50mg/m<sup>2</sup></td> <td>day 2</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>750mg/m<sup>2</sup></td> <td>day 2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day 2-6</td> </tr> </tbody> </table>  | 薬品名(成分名)                            | 投与量     | 投与日 | ボテリジオ(モガムリズマブ) | 1mg/kg | day 1 | オンコビン(ビンクリスチン) | 1.4mg/m <sup>2</sup> (max 2mg/body) | day 2 | ドキシソルピシン(ドキシソルピシン) | 50mg/m <sup>2</sup> | day 2 | エンドキサン(シクロホスファミド) | 750mg/m <sup>2</sup> | day 2 | プレドニン(プレドニゾン) | 100mg/body | day 2-6 | <p>投与サイクル数<br/>6サイクル</p> <p>総投与時間<br/>day1:2時間40分<br/>day2:1時間50分</p> <p>血管外漏出リスク<br/>ボテリジオ(モガムリズマブ):不明<br/>オンコビン(ビンクリスチン):壊死性抗がん剤<br/>ドキシソルピシン:壊死性抗がん剤<br/>エンドキサン(シクロホスファミド):炎症性抗がん剤</p> | <p>day 1</p> <p><b>点滴静注</b></p> <p>① 生理食塩液 100 ml<br/>ルート確保・フラッシュ用</p> <p>② ソルコーテフ 100 mg<br/>生理食塩液 100 ml<br/>点滴 30分</p> <p>③ ボテリジオ mg<br/>生理食塩液 250 ml<br/>点滴 2時間</p> |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 薬品名(成分名)  | 投与量                                 | 投与日     |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| ボテリジオ(モガムリズマブ)  | 1mg/kg                              | day 1   |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| オンコビン(ビンクリスチン)  | 1.4mg/m <sup>2</sup> (max 2mg/body) | day 2   |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)  | 50mg/m <sup>2</sup>                 | day 2   |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| エンドキサン(シクロホスファミド)   | 750mg/m <sup>2</sup>                | day 2   |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| プレドニン(プレドニゾン)   | 100mg/body                          | day 2-6 |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| <p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">モガムリズマブ+CHOP療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボテリジオ 1mg/kg</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコビン 1.4mg/m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキシソルピシン 50mg/m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン 750mg/m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン 100mg/body</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | モガムリズマブ+CHOP療法                      |         |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   | 治療日                  | 1     | 2             | 3          | 4       | 5   | 6   | .. | .. | .. | .. | .. | 21 | ボテリジオ 1mg/kg | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | オンコビン 1.4mg/m <sup>2</sup> |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ドキシソルピシン 50mg/m <sup>2</sup> |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | プレドニン 100mg/body |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | <p>投与時の注意事項<br/>・ボテリジオのインフュージョンリアクションを軽減させるため、投与30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモンの前投与を行う。</p> <p>備考欄<br/>7サイクル目以降は、モガムリズマブ単独を2コース行う。</p> | <p>day 2</p> <p>内服<br/>プレドニン 錠<br/>分2朝食後</p> <p><b>点滴静注</b></p> <p>① 生理食塩液 100 ml<br/>ルート確保・フラッシュ用</p> <p>② グラニセトロン静注バッグ 50 ml<br/>全開</p> <p>③ オンコビン mg<br/>生理食塩液 50 ml<br/>全開</p> <p>④ ドキシソルピシン mg<br/>生理食塩液 50 ml<br/>点滴 30分</p> <p>⑤ エンドキサン mg<br/>生理食塩液 250 ml<br/>点滴 60分</p> | <p>day 3-6</p> <p>内服<br/>プレドニン 錠<br/>分2朝食後</p> |
| モガムリズマブ+CHOP療法  |                                     |         |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 治療日   | 1                                   | 2       | 3   | 4              | 5      | 6     | ..             | ..                                  | ..    | ..                 | ..                  | 21    |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| ボテリジオ 1mg/kg  | ●                                   |         |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| オンコビン 1.4mg/m <sup>2</sup>  |                                     | ●       |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| ドキシソルピシン 50mg/m <sup>2</sup>  |                                     | ●       |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup>   |                                     | ●       |     |                |        |       |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| プレドニン 100mg/body  |                                     | ●       | ●   | ●              | ●      | ●     |                |                                     |       |                    |                     |       |                   |                      |       |               |            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |