

がん化学療法指示書

登録番号 353

作成日 2022/9/8

レジメン名	Weekly PTX療法(7週毎)
診療科・対象疾患	(外)切除不能・再発食道癌
投与間隔	7週毎
投与サイクル数	PDまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15,22,29,36

治療内容	投与順	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																		
							day1	...	day8	...	day15	...	day22	...	day29	...	day36	...	day49						
注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●		●		●		●		●		●								
	Rp2		グラニセトロン注(3mg/50mL)	1袋	15分	点滴静注メイン	●		●		●		●		●		●								
			デキサート注(6.6mg)	1瓶																					
			ファモチジン注(20mg)	1瓶																					
	Rp3		生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン 経過観察用	●		●		●		●		●		●								
	Rp4	●	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	60分	点滴静注メイン	●		●		●		●		●		●								
			生理食塩液	250mL																					
	内服																								
	その他必要薬剤	day1,8,15,22,29,36 レスタミンコーワ錠(10mg)5錠を点滴開始時に内服																							
総投与時間	1時間55分																								
血管外漏出リスク	パクリタキセル:壊死性抗がん剤																								
投与時の注意事項	パクリタキセル ・溶媒にエタノールを含有しているため、アルコール過敏の有無を確認する ・過敏症予防のためステロイド、H1・H2ブロッカーの前投薬が必要 ・フィルター付きルートで投与																								
備考欄																									