がん化学療法指示書

登録番号　354

作成日　2022/10/12

レジメン名	ニボルマブ療法(2週毎)
診療科・対象疾患	(泌)尿路上皮癌における術後補助療法
投与間隔	2週毎
投与サイクル数	最長12ヶ月まで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オプジーボ	ニボルマブ	240mg/body	day1

治療内容

注射

滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール day1								day14
Rp1		生理食塩液	100ml	任意	ルート確保用	●								
Rp2	癌	オプジーボ(ニボルマブ)	240mg	30分	点滴静注メイン	●								
		生理食塩液	100ml		総量100mLにする									
Rp3		生理食塩液	50ml	15分	フラッシュ用	●								

内服

その他必要薬剤	
総投与時間	45分
血管外漏出リスク	オプジーボ(ニボルマブ):非壊死性抗がん薬
投与時の注意事項	オプジーボ(ニボルマブ):フィルター付きルートが必要 シリコーン製のCVポートは蛋白質の凝集を認めるため、使用を避ける。
備考欄	Infusion Reaction Grade2の場合、オプジーボ(ニボルマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠