

レジメン名

リツキシマブ+ベネトクラクス療法(1サイクル目) 対象疾患 再発・難治慢性リンパ性白血病

ChemoNavi

薬品名(成分名)	投与量	投与日
リツキサン(リツキシマブ)	375mg/m <sup>2</sup>	day1
※ベネクレクスタ(ベネトクラクス)	400mg/body	day1-28

本治療はベネクレクスタ錠の用量漸増期終了後に開始すること

※

ベネクレクスタは用量漸増期は第1週目に20mg、第2週目に50mg、第3週目に100mg、第4週目に200mg、第5週目に400mg1日1回、7日間食後に経口投与する。  
維持投与期は、400mgを1日1回、食後に経口投与する。

## 【CYP阻害剤併用時のベネクレクスタ用量調節基準】

併用薬剤	用量漸増期	維持投与期
中等度のCYP阻害剤	ベネクレクスタを半量以下にすること	
強いCYP阻害剤	ベネクレクスタを併用しないこと	ベネクレクスタを100mg以下に減量すること

## 投与スケジュール

リツキシマブ+ベネトクラクス療法 1サイクル目									
治療日	1	2	3	4	5	6	7	...	28
リツキサン	●								
ベネクレクスタ	●	●	●	●	●	●	●		●

投与サイクル数	1サイクル	治療内容	
		day1	
総投与時間	A設定:約4時間	内服	内服 ①ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーウ 3錠 点滴開始時
血管外漏出リスク	リツキサン(リツキシマブ) :不明	点滴	点滴 A設定 ②生理食塩液 100ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ③生理食塩液 100ml ソル・コーテフ 100mg 点滴、30分 ↓ ④生理食塩液 ml リツキサン mg 滴下速度の設定 A設定 50ml/h ↓ 250ml/h (30分) ↓ (30分) 100ml/h ↓ 300ml/h (30分) ↓ (30分) 150ml/h ↓ 350ml/h (30分) ↓ (30分) 200ml/h ↓ 400ml/h (30分) ↓
投与時の注意事項	day1: リツキサンによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーウ10mg3錠を内服	備考欄	