

レジメン名 リツキシマブ+ベネトクラクス療法(2サイクル目以降) 対象疾患 再発・難治慢性リンパ性白血病

ChemoNavi			治療内容																																											
<table border="1"> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> <tr> <td>リツキサン(リツキシマブ)</td> <td>500mg/m<sup>2</sup></td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ベネクレクスタ(ベネトクラクス)</td> <td>400mg/body</td> <td>day1-28</td> </tr> </table>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	リツキサン(リツキシマブ)	500mg/m <sup>2</sup>	day1	ベネクレクスタ(ベネトクラクス)	400mg/body	day1-28	投与 サイクル数	5サイクル	治療内容 day1  <b>内服</b> ① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーフ 3錠 点滴開始時  <b>点滴</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">A設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 ml リツキサン mg 滴下速度の設定 A設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>50ml/h ↓ (30分) 250ml/h ↓ (30分) 100ml/h ↓ (30分) 300ml/h ↓ (30分) 150ml/h ↓ (30分) 350ml/h ↓ (30分) 200ml/h ↓ (30分) 400ml/h</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">B設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 ml リツキサン mg 滴下速度の設定 B設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>100ml/h (30分) ↓ 200ml/h (30分) ↓ 300ml/h (30分) ↓ 400ml/h</p> </div> </div>																																
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																												
リツキサン(リツキシマブ)	500mg/m <sup>2</sup>	day1																																												
ベネクレクスタ(ベネトクラクス)	400mg/body	day1-28																																												
【CYP阻害剤併用時のベネクレクスタ用量調節基準】			総投与時間	A設定:約4時間 B設定:約3時間																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>併用薬剤</th> <th>用量漸増期</th> <th>維持投与期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中等度のCYP阻害剤</td> <td colspan="2">ベネクレクスタを半量以下にすること</td> </tr> <tr> <td>強いCYP阻害剤</td> <td>ベネクレクスタを併用しないこと</td> <td>ベネクレクスタを100mg以下に減量すること</td> </tr> </tbody> </table>			併用薬剤	用量漸増期	維持投与期	中等度のCYP阻害剤	ベネクレクスタを半量以下にすること		強いCYP阻害剤	ベネクレクスタを併用しないこと	ベネクレクスタを100mg以下に減量すること	血管外漏出 リスク	リツキシマブ:不明																																	
併用薬剤	用量漸増期	維持投与期																																												
中等度のCYP阻害剤	ベネクレクスタを半量以下にすること																																													
強いCYP阻害剤	ベネクレクスタを併用しないこと	ベネクレクスタを100mg以下に減量すること																																												
投与スケジュール			投与時の 注意事項	・day1: リツキサンによるインフュー ジョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロ フェン60mg1錠、レスタミン コーフ10mg3錠を内服																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">リツキシマブ+ベネトクラクス療法 2サイクル目以降</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキサン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ベネクレクスタ</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>			リツキシマブ+ベネトクラクス療法 2サイクル目以降										治療日	1	2	3	4	5	6	7	...	28	リツキサン	●										ベネクレクスタ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	備考欄	
リツキシマブ+ベネトクラクス療法 2サイクル目以降																																														
治療日	1	2	3	4	5	6	7	...	28																																					
リツキサン	●																																													
ベネクレクスタ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																				