

がん化学療法指示書

登録番号 359

作成日 2022/11/9

レジメン名	ペムプロリズマブ療法(3週毎)
診療科・対象疾患	(外)ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳がんにおける術後療法
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	9サイクルまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day21	
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100mL	任意	ルート確保用	●							
		Rp2	痛	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	200mg	30分	点滴静注メイン	●						
				生理食塩液	100mL									
		Rp3	生理食塩液	50mL	15分	フラッシュ用	●							
その他必要薬剤														
総投与時間	45分													
血管外漏出リスク	キイトルーダ(ペムプロリズマブ):非壊死性抗がん薬													
投与時の注意事項	キイトルーダ(ペムプロリズマブ):フィルター付きルートが必要 インフュージョンリアクションGrade2の場合:本剤の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 【インフュージョンリアクション経験例の前処置処方例】 投与前1.5時間(±0.5時間)に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠													
備考欄	PTX+CBDCA+ペムプロリズマブ療法→EC+ペムプロリズマブ療法→手術後に当レジメンを実施する。													