

レジメン名 ネララビン療法

対象疾患 T細胞急性リンパ性白血病、T細胞リンパ芽球性リンパ腫

ChemoNavi					治療内容																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アラノジー(ネララビン)</td> <td>1500mg/m<sup>2</sup></td> <td>day1, 3, 5</td> </tr> </tbody> </table>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	アラノジー(ネララビン)	1500mg/m <sup>2</sup>	day1, 3, 5	投与 サイクル 数	PDまで	day1.3.5  点滴静注 ①生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ②アラノジー mg アリメバックに薬液を注入する 点滴 2時間																														
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																							
アラノジー(ネララビン)	1500mg/m <sup>2</sup>	day1, 3, 5																																							
			総投与 時間	2時間10分																																					
			血管外 漏出 リスク	アラノジー (ネララビン): 非壊死性抗がん剤																																					
投与スケジュール																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">ネララビン療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ネララビン</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ネララビン療法											治療日	1	2	3	4	5	..	..	..	..	21	ネララビン	●		●		●						投与時の 注意 事項		
ネララビン療法																																									
治療日	1	2	3	4	5	..	..	..	..	21																															
ネララビン	●		●		●																																				
			備考欄	・アラノジー (ネララビン)は希釈せず 使用する。																																					