# がん化学療法指示書

登録番号　361

作成日　2022/12/14

| | |
|---|---|
| レジメン名 | PTX+CBDCA(AUC5)＋ペムブロリズマブ（6週毎）療法 |
| 診療科・対象疾患 | （外）ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前療法 |
| 投与間隔 | 6週毎 |
| 投与サイクル数 | 2サイクル |

Chemo Navi

| 薬剤名 | 成分名 | 投与量 | 投与日 |
|---|---|---|---|
| キイトルーダ | ペムブロリズマブ | 400mg/body | Day1 |
| パクリタキセル | パクリタキセル | 80mg/㎡ | Day1、8、15、22、29、36 |
| カルボプラチン | カルボプラチン | AUC5.0 | Day1,22 |

内服　注

| 滴下順 | 抗癌剤 | 薬剤（成分名） | 投与量 | 時間 | 投与方法 | day1 | ・・・ | day8 | ・・・ | day15 | ・・・ | day22 | ・・・ | day29 | ・・・ | day36 | ・・・ | day42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 | | 生理食塩液 | 100mL | 任意 | ルート確保・フラッシュ用 | ● | | | | | | | | | | | | |
| Rp2 | | グラニセトロン注（3mg/50mL） | 1袋 | 15分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート注（6.6mg） | 1瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ファモチジン注（20mg） | 1瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp3 | 癌 | **キイトルーダ(ペムブロリズマブ)** | 400mg | 30分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総量100mLにする | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp4 | | 生理食塩液 | 50mL | 15分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 経過観察用 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp5 | 癌 | **パクリタキセル** | 80mg/㎡ | 60分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP6 | 癌 | **カルボプラチン** | AUC5.0 | 60分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 250ml | | | | | | | | | | | | | | | |

| 滴下順 | 抗癌剤 | 薬剤（成分名） | 投与量 | 時間 | 投与方法 | day1 | ・・・ | day8 | ・・・ | day15 | ・・・ | day22 | ・・・ | day29 | ・・・ | day36 | ・・・ | day42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 | | 生理食塩液 | 100mL | 任意 | ルート確保・フラッシュ用 | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | |
| Rp2 | | 生理食塩液 | 1袋 | 15分 | 点滴静注メイン | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | |
| | | デキサート注（6.6mg） | 1瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ファモチジン注（20mg） | 1瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp3 | | 生理食塩液 | 100mL | 30分 | 点滴静注メイン | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | |
| | | | | | 経過観察用 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp4 | 癌 | **パクリタキセル** | 80mg/㎡ | 60分 | 点滴静注メイン | | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | |
| | | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |

| 滴下順 | 抗癌剤 | 薬剤（成分名） | 投与量 | 時間 | 投与方法 | day1 | ・・・ | day8 | ・・・ | day15 | ・・・ | day22 | ・・・ | day29 | ・・・ | day36 | ・・・ | day42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 | | 生理食塩液 | 100mL | 任意 | ルート確保・フラッシュ用 | | | | | | | ● | | | | | | |
| Rp2 | | グラニセトロン注（3mg/50mL） | 1袋 | 15分 | 点滴静注メイン | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | デキサート注（6.6mg） | 1瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ファモチジン注（20mg） | 1瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp3 | | 生理食塩液 | 100mL | 30分 | 点滴静注メイン | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | | | | 経過観察用 | | | | | | | | | | | | | |
| Rp4 | 癌 | **パクリタキセル** | 80mg/㎡ | 60分 | 点滴静注メイン | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rp5 | 癌 | **カルボプラチン** | AUC5.0 | 60分 | 点滴静注メイン | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 250ml | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| その他必要薬剤 | ・Day1、8、15、22、29、36それぞれにレスタミンコーワ錠（10mg）5錠を点滴開始時に内服<br>・Day1、22　アプレピタントカプセル125mg　1カプセル　点滴開始時<br>・Day2-3、23-24　アプレピタントカプセル80mg　1カプセル　朝食後<br>・Day2-4、23-25　デカドロン錠4mg　1錠分1　朝食後 |
| 総投与時間 | Day1 3時間10分、Day8、15、29、36　1時間55分、Day22　2時間55分 |
| 血管外漏出リスク | パクリタキセル：壊死性抗がん剤<br>カルボプラチン：炎症性抗がん剤<br>キイトルーダ（ペムブロリズマブ）：非壊死性抗がん剤 |
| 投与時の注意事項 | パクリタキセルはアルコール過敏の有無を確認<br>キイトルーダ（ペムブロリズマブ）、パクリタキセルはフィルター付きルート要 |
| 備考欄 | ・2サイクル終了後、EC+ペムブロリズマブ療法を実施する。<br>・Infusion Reaction Grade2の場合、キイトルーダ（ペムブロリズマブ）の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。<br>・Infusion Reaction経験例では、次回よりアセトアミノフェン錠300mg2錠追加、キイトルーダ（ペムブロリズマブ）の投与速度を60分で投与検討する。 |