

レジメン名	ペムブロリズマブ療法(6週毎)
診療科・対象疾患	(外)ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法
投与間隔	6週毎
投与サイクル数	5サイクルまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day42	
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100mL	任意	ルート確保用	●							
		Rp2	痛	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400mg	30分	点滴静注メイン	●						
				生理食塩液 総量100mLにする	100mL									
		Rp3		生理食塩液	50mL	15分	フラッシュ用	●						
その他必要薬剤														
総投与時間	55分													
血管外漏出リスク	キイトルーダ(ペムブロリズマブ):非壊死性抗がん薬													
投与時の注意事項	キイトルーダ(ペムブロリズマブ):フィルター付きルートが必要 ・Infusion Reaction Grade2の場合、キイトルーダ(ペムブロリズマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 ・Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠													
備考欄	PTX+CBDCA+ペムブロリズマブ療法→EC+ペムブロリズマブ療法→手術後に当レジメンを実施する。													