

レジメン名 AI療法

対象疾患 悪性軟部腫瘍

ChemoNavi			治療内容																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イホマイド(イホスファミド)</td> <td>2g/m²</td> <td>day1.2.3</td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td>30mg/m²</td> <td>day1.2.3</td> </tr> <tr> <td>ウロミテキサン(メスナ)</td> <td>400mg/m² × 3</td> <td>day1.2.3</td> </tr> </tbody> </table>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	イホマイド(イホスファミド)	2g/m ²	day1.2.3	ドキソルビシン	30mg/m ²	day1.2.3	ウロミテキサン(メスナ)	400mg/m ² × 3	day1.2.3	投与サイクル数	4サイクルまで	<p>day1-3</p> <p>① 生理食塩液 1000mL メイロン 40mL 点滴 メイン 9:00~ 翌9:00 24時間</p> <p>別ルートから投与</p> <p>② 生理食塩液 100mL 点滴 10:00~ ルート確保・フラッシュ用</p> <p>③ グラニセトロンパック 1袋 デキサート 9.9mg 点滴 10:10~10:25 15分</p> <p>④ イホマイド 500mL mg 点滴 10:25~12:25 2時間</p> <p>⑥ ドキソルビシン 250mL mg 点滴 12:25~14:25 2時間</p> <p>⑦ 生理食塩液 500mL 点滴 14:25~15:25 1時間</p> <p>⑧ 生理食塩液 500mL 点滴 15:25~16:25 1時間</p> <p>⑤ ウロミテキサン mg ※ワンシヨット RP.4 同時投与 側管</p> <p>⑨ ウロミテキサン mg ※ワンシヨット RP.7 同時投与 側管</p> <p>⑩ ウロミテキサン mg ※ワンシヨット 18:25 側管</p>																															
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																														
イホマイド(イホスファミド)	2g/m ²	day1.2.3																																														
ドキソルビシン	30mg/m ²	day1.2.3																																														
ウロミテキサン(メスナ)	400mg/m ² × 3	day1.2.3																																														
投与スケジュール			総投与時間	day1 15時間 day2.3 24時間 day4 9時間																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AI療法</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治療日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イホスファミド</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			AI療法	1	2	3	21	治療日											イホスファミド	●	●	●								ドキソルビシン	●	●	●								血管外漏出リスク	イホマイド(イホスファミド): 炎症性抗がん剤 ドキソルビシン: 壊死性抗がん剤
AI療法	1	2	3	21																																						
治療日																																																
イホスファミド	●	●	●																																													
ドキソルビシン	●	●	●																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>投与時の注意事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イホマイドは溶解後、8時間以内で使用すること。</td> </tr> <tr> <td>ウロミテキサンはイホマイド投与開始時、投与開始4時間後、投与開始8時間後に投与する。</td> </tr> <tr> <td>※ウロミテキサン投与前後は生理食塩液でフラッシュする。</td> </tr> </tbody> </table>			投与時の注意事項	イホマイドは溶解後、8時間以内で使用すること。	ウロミテキサンはイホマイド投与開始時、投与開始4時間後、投与開始8時間後に投与する。	※ウロミテキサン投与前後は生理食塩液でフラッシュする。	投与時の注意事項																																									
投与時の注意事項																																																
イホマイドは溶解後、8時間以内で使用すること。																																																
ウロミテキサンはイホマイド投与開始時、投与開始4時間後、投与開始8時間後に投与する。																																																
※ウロミテキサン投与前後は生理食塩液でフラッシュする。																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>その他薬剤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>day1 アプレピタントカプセル 125mg 点滴開始時服用</td> </tr> <tr> <td>day2, 3 アプレピタントカプセル 80mg分1 朝食後</td> </tr> </tbody> </table>			その他薬剤	day1 アプレピタントカプセル 125mg 点滴開始時服用	day2, 3 アプレピタントカプセル 80mg分1 朝食後	その他薬剤																																										
その他薬剤																																																
day1 アプレピタントカプセル 125mg 点滴開始時服用																																																
day2, 3 アプレピタントカプセル 80mg分1 朝食後																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>備考欄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・1コース目FNあれば、2コース目以降、G-CSF考慮する。</td> </tr> <tr> <td>・経口摂取減少あれば適宜1000mL補液追加検討する。</td> </tr> </tbody> </table>			備考欄	・1コース目FNあれば、2コース目以降、G-CSF考慮する。	・経口摂取減少あれば適宜1000mL補液追加検討する。	備考欄																																										
備考欄																																																
・1コース目FNあれば、2コース目以降、G-CSF考慮する。																																																
・経口摂取減少あれば適宜1000mL補液追加検討する。																																																
			day1	day2.3																																												
			アプレピタントカプセル125mg 1カプセル 点滴開始時	アプレピタントカプセル80mg 1カプセル 分1 朝食後																																												