

登録番号 365 作成日 2022年1月11日

指示書2枚の内 No.1

レジメン名 R-CEOP療法

対象疾患 非ホジキンリンパ腫

ChemoNavi		治療内容																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>750mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td>50mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ピンクリスチン)</td> <td>1.4mg/m² (max2.0mg/body)</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day2~6</td> </tr> <tr> <td>ラステットSカプセル(エトポシド)</td> <td>100mg/m²</td> <td>day3~4</td> </tr> </tbody> </table>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	エンドキサン(シクロホスファミド)	750mg/m ²	day2	エトポシド	50mg/m ²	day2	オンコピン(ピンクリスチン)	1.4mg/m ² (max2.0mg/body)	day2	プレドニン(プレドニゾロン)	100mg/body	day2~6	ラステットSカプセル(エトポシド)	100mg/m ²	day3~4	投与サイクル数 8サイクルまで	day1 ① <table border="1"> <tr> <td>ロキソプロフェン</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">内服</td> </tr> </table>		ロキソプロフェン	1錠	レスタミンコーワ	3錠	内服																																																																						
	薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																
	リツキシマブ	375mg/m ²	day1																																																																																																
	エンドキサン(シクロホスファミド)	750mg/m ²	day2																																																																																																
エトポシド	50mg/m ²	day2																																																																																																	
オンコピン(ピンクリスチン)	1.4mg/m ² (max2.0mg/body)	day2																																																																																																	
プレドニン(プレドニゾロン)	100mg/body	day2~6																																																																																																	
ラステットSカプセル(エトポシド)	100mg/m ²	day3~4																																																																																																	
ロキソプロフェン	1錠																																																																																																		
レスタミンコーワ	3錠																																																																																																		
内服																																																																																																			
	総投与時間 A設定: 約4時間 B設定: 約3時間	<table border="1"> <tr> <td>A設定</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B設定</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		A設定	<input type="checkbox"/>	B設定	<input type="checkbox"/>																																																																																												
A設定	<input type="checkbox"/>																																																																																																		
B設定	<input type="checkbox"/>																																																																																																		
	血管外漏出リスク リツキシマブ: 不明	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A設定</th> <th colspan="2">B設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>② 生理食塩液</td> <td>100 ml</td> <td>② 生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td> <td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液</td> <td>100 ml</td> <td>③ 生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td>ソル・コーテフ</td> <td>100 mg</td> <td>ソル・コーテフ</td> <td>100 mg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、30分</td> <td colspan="2">点滴、30分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液</td> <td>ml</td> <td>④ 生理食塩液</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375 mg/m²</td> <td>リツキシマブ</td> <td>375 mg/m²</td> </tr> <tr> <td colspan="2">滴下速度の設定</td> <td colspan="2">滴下速度の設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A設定</td> <td colspan="2">B設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>50ml/h</td> <td>↓</td> <td>100ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>250ml/h</td> <td>(30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>(30分)</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100ml/h</td> <td>↓</td> <td>200ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>300ml/h</td> <td>(30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>(30分)</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>150ml/h</td> <td>↓</td> <td>300ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>350ml/h</td> <td>(30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>(30分)</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200ml/h</td> <td>↓</td> <td>400ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>400ml/h</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A設定		B設定		② 生理食塩液	100 ml	② 生理食塩液	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		ルート確保・フラッシュ用		↓		↓		③ 生理食塩液	100 ml	③ 生理食塩液	100 ml	ソル・コーテフ	100 mg	ソル・コーテフ	100 mg	点滴、30分		点滴、30分		↓		↓		④ 生理食塩液	ml	④ 生理食塩液	ml	リツキシマブ	375 mg/m ²	リツキシマブ	375 mg/m ²	滴下速度の設定		滴下速度の設定		A設定		B設定		-----		-----		50ml/h	↓	100ml/h		(30分)	250ml/h	(30分)		↓	(30分)	↓		100ml/h	↓	200ml/h		(30分)	300ml/h	(30分)		↓	(30分)	↓		150ml/h	↓	300ml/h		(30分)	350ml/h	(30分)		↓	(30分)	↓		200ml/h	↓	400ml/h		(30分)	400ml/h		
A設定		B設定																																																																																																	
② 生理食塩液	100 ml	② 生理食塩液	100 ml																																																																																																
ルート確保・フラッシュ用		ルート確保・フラッシュ用																																																																																																	
↓		↓																																																																																																	
③ 生理食塩液	100 ml	③ 生理食塩液	100 ml																																																																																																
ソル・コーテフ	100 mg	ソル・コーテフ	100 mg																																																																																																
点滴、30分		点滴、30分																																																																																																	
↓		↓																																																																																																	
④ 生理食塩液	ml	④ 生理食塩液	ml																																																																																																
リツキシマブ	375 mg/m ²	リツキシマブ	375 mg/m ²																																																																																																
滴下速度の設定		滴下速度の設定																																																																																																	
A設定		B設定																																																																																																	
-----		-----																																																																																																	
50ml/h	↓	100ml/h																																																																																																	
(30分)	250ml/h	(30分)																																																																																																	
↓	(30分)	↓																																																																																																	
100ml/h	↓	200ml/h																																																																																																	
(30分)	300ml/h	(30分)																																																																																																	
↓	(30分)	↓																																																																																																	
150ml/h	↓	300ml/h																																																																																																	
(30分)	350ml/h	(30分)																																																																																																	
↓	(30分)	↓																																																																																																	
200ml/h	↓	400ml/h																																																																																																	
(30分)	400ml/h																																																																																																		
投与スケジュール <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">R-CEOP療法</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>.....</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治療日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラステットSカプセル</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	R-CEOP療法		1	2	3	4	5	6	7	21	治療日											リツキシマブ		●									エンドキサン			●								エトポシド			●								オンコピン			●								プレドニン			●	●	●	●					ラステットSカプセル			●	●							その他必要薬剤 ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠	*day1: リツキシマブによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服									
R-CEOP療法		1	2	3	4	5	6	7	21																																																																																									
治療日																																																																																																			
リツキシマブ		●																																																																																																	
エンドキサン			●																																																																																																
エトポシド			●																																																																																																
オンコピン			●																																																																																																
プレドニン			●	●	●	●																																																																																													
ラステットSカプセル			●	●																																																																																															
	備考欄																																																																																																		

登録番号 365 作成日 2022年1月11日

指示書2枚の内 No.2

レジメン名 R-CEOP療法

対象疾患 非ホジキンリンパ腫

ChemoNavi				治療内容																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>750mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td>50mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>1.4mg/m² (max2.0mg/body)</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day2~6</td> </tr> <tr> <td>ラステットSカプセル(エトポシド)</td> <td>100mg/m2</td> <td>day3~4</td> </tr> </tbody> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	エンドキサン(シクロホスファミド)	750mg/m ²	day2	エトポシド	50mg/m ²	day2	オンコピン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ² (max2.0mg/body)	day2	プレドニン(プレドニゾロン)	100mg/body	day2~6	ラステットSカプセル(エトポシド)	100mg/m2	day3~4	投与 サイクル数	8サイクルまで	day2 ① 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ② グラニセトロン注 1 袋 点滴、全開 ↓ ③ オンコピン _____ mg 生理食塩液 50 ml 点滴、全開 ↓ ④ エトポシド _____ mg 生理食塩液 250 ml 点滴、1時間 ↓ ⑤ エンドキサン _____ mg 生理食塩液 250 ml 点滴、1時間																																																																											
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																		
リツキシマブ	375mg/m ²	day1																																																																																																		
エンドキサン(シクロホスファミド)	750mg/m ²	day2																																																																																																		
エトポシド	50mg/m ²	day2																																																																																																		
オンコピン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ² (max2.0mg/body)	day2																																																																																																		
プレドニン(プレドニゾロン)	100mg/body	day2~6																																																																																																		
ラステットSカプセル(エトポシド)	100mg/m2	day3~4																																																																																																		
投与スケジュール		総投与時間	2時間30分																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">R-CEOP療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>.....</th> <th>21</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラステットSカプセル</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		R-CEOP療法												治療日	1	2	3	4	5	6	7	21			リツキシマブ	●											エンドキサン		●										エトポシド		●										オンコピン		●										プレドニン		●	●	●	●	●						ラステットSカプセル			●	●								血管外漏出 リスク	オンコピン(ビンクリスチン): 壊死性抗がん剤 ラステット(エトポシド): 炎症性抗がん剤 エンドキサン(シクロホスファミド): 炎症性抗がん剤	day2-6 プレドニン錠5mg 錠 分2 朝食後
R-CEOP療法																																																																																																				
治療日	1	2	3	4	5	6	7	21																																																																																											
リツキシマブ	●																																																																																																			
エンドキサン		●																																																																																																		
エトポシド		●																																																																																																		
オンコピン		●																																																																																																		
プレドニン		●	●	●	●	●																																																																																														
ラステットSカプセル			●	●																																																																																																
		その他 必要な薬剤		day3-4 ラステットSカプセル25mg 錠 分2 朝食後																																																																																																
		投与時の 注意事項																																																																																																		
		備考欄																																																																																																		