

がん化学療法指示書

登録番号 368

作成日 2023.2.8

レジメン名	mFOLFIRINOX療法
診療科・対象疾患	消)進行、再発肺癌
投与間隔	2週間
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オキサリプラチン	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1
イリノテカン	イリノテカン	150mg/m ²	day1
レボホリナート	レボホリナート	200mg/m ²	day1
フルオロウラシル(持続点滴)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1~3

内服	注	順下	剤	抗	癌	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
										day1	day2	day3	day14	
		Rp1				生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
		Rp.2				生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●							
						ホスアプレピタント	1瓶										
		Rp3				グラニセトロンパック(3mg/50mL)	1袋	15分	点滴静注メイン	●							
						デキサート(6.6mg)	1管										
						デキサート(1.65mg)	2管										
						アトロピン注	1管										
		Rp4	癌			オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注メイン	●							
						5%ブドウ糖液	250mL										
		Rp5	癌			イリノテカン	150mg/m ²	90分	点滴静注メイン								
						5%ブドウ糖液	250mL										
						Rp5とRp6は同時に投与											
						※1(投与の注意事項参照)											
		Rp6				レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注側管	●							
						5%ブドウ糖液	250mL										
						Rp.5とRp.6は同時に投与											
		Rp7	癌			フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	持続点滴	●	●	●					
						生理食塩液	200mL										
						ヘパリンNa	1mL										
						総量を140mLにする											
		Rp8				ヘパリンロックNaロック用100単位/mL シリンジ	1筒		ワンショット			●					
						抜針用											
	内服																
	その他 必要薬剤	day2-4 デカドロン錠4mg 2錠分2 朝昼食後															
	総投与時間	day1:5時間(フルオロウラシルの持続点滴を除く) day1~3:46時間(フルオロウラシルの持続点滴のみ)															
	血管外漏出 リスク	オキサリプラチン: 炎症性抗がん剤 5-FU: 炎症性抗がん剤															
	投与時の 注意事項	※1.Rp.5Rp.6両方終了後、トレフューザーポンプ接続前にルート確保用の生理食塩液を5分間流す															
	備考欄																