

がん化学療法指示書

登録番号 378

作成日 2023/3/22

レジメン名	デュルバルマブ+トレメリムマブ療法
診療科・対象疾患	(消)切除不能な肝細胞癌
投与間隔	4週毎
投与サイクル数	1コース

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
イジウド	トレメリムマブ	300mg/body	Day1
イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg/body	Day1

治療内容	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール					
							day1	day28
							Rp1	生理食塩液	100mL	任意	ルート確保用	●
Rp2	癌	イジウド(トレメリムマブ)	300mg/body	60分	点滴静注メイン	●						
		生理食塩液	100mL									
Rp3		生理食塩液	50mL	15分	経過観察用	●						
Rp4	癌	イミフィンジ(デュルバルマブ)	1500mg/body	60分	点滴静注メイン	●						
		生理食塩液	250mL									
Rp5		生理食塩液	50mL	15分	フラッシュ用	●						
内服												
その他必要薬剤												
総投与時間	2時間45分											
血管外漏出リスク	イジウド(トレメリムマブ):非壊死性抗がん剤 イミフィンジ(デュルバルマブ):非壊死性抗がん剤											
投与時の注意事項	イジウド(トレメリムマブ)、イミフィンジ(デュルバルマブ)はフィルター付きルート要											
備考欄	Infusion Reaction Grade2の場合、イミフィンジ(デュルバルマブ)あるいはイジウド(トレメリムマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠											