

レジメン名

モガムリズマブ+THP-COP療法

対象疾患

ATL(成人T細胞性白血病リンパ腫)

ChemoNavi					治療内容																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名※()は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ(モガムリズマブ)</td> <td>1mg/kg</td> <td>day 1</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>1.4mg/m<sup>2</sup>(max 2mg/body)</td> <td>day 2</td> </tr> <tr> <td>ピノルビン(ピラルピシン)</td> <td>50mg/m<sup>2</sup></td> <td>day 2</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロフォスファミド)</td> <td>750mg/m<sup>2</sup></td> <td>day 2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day 2-6</td> </tr> </tbody> </table>			薬品名※()は成分名	投与量	投与日	ポテリジオ(モガムリズマブ)	1mg/kg	day 1	オンコピン(ビンクリスチン)	1.4mg/m <sup>2</sup> (max 2mg/body)	day 2	ピノルビン(ピラルピシン)	50mg/m <sup>2</sup>	day 2	エンドキサン(シクロフォスファミド)	750mg/m <sup>2</sup>	day 2	プレドニン(プレドニゾロン)	100mg/body	day 2-6	<p>投与 サイクル数</p> <p>6サイクル</p>	<p>day 1</p> <p>※ 内服</p> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>3 錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン300mg</td> <td>1 錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン200mg</td> <td>1 錠</td> </tr> </table> <p>点滴開始時に内服</p> <p>↓</p> <p>点滴静注 ①</p> <table border="1"> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> </table> <p>↓</p> <p>②</p> <table border="1"> <tr> <td>ソルコーテフ</td> <td>100 mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> </table> <p>点滴 10:00-10:30 30分</p> <p>↓</p> <p>③</p> <table border="1"> <tr> <td>ポテリジオ</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250 ml</td> </tr> </table> <p>点滴 10:30-12:30 2時間</p>		レスタミンコーワ	3 錠	アセトアミノフェン300mg	1 錠	アセトアミノフェン200mg	1 錠	生理食塩液	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		ソルコーテフ	100 mg	生理食塩液	100 ml	ポテリジオ	mg	生理食塩液	250 ml																																																																													
薬品名※()は成分名	投与量	投与日																																																																																																																				
ポテリジオ(モガムリズマブ)	1mg/kg	day 1																																																																																																																				
オンコピン(ビンクリスチン)	1.4mg/m <sup>2</sup> (max 2mg/body)	day 2																																																																																																																				
ピノルビン(ピラルピシン)	50mg/m <sup>2</sup>	day 2																																																																																																																				
エンドキサン(シクロフォスファミド)	750mg/m <sup>2</sup>	day 2																																																																																																																				
プレドニン(プレドニゾロン)	100mg/body	day 2-6																																																																																																																				
レスタミンコーワ	3 錠																																																																																																																					
アセトアミノフェン300mg	1 錠																																																																																																																					
アセトアミノフェン200mg	1 錠																																																																																																																					
生理食塩液	100 ml																																																																																																																					
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																						
ソルコーテフ	100 mg																																																																																																																					
生理食塩液	100 ml																																																																																																																					
ポテリジオ	mg																																																																																																																					
生理食塩液	250 ml																																																																																																																					
<p>総投与時間</p> <p>1日目:2時間40分 2日目:1時間50分</p>			<p>血管外漏出 リスク</p> <p>ポテリジオ:非炎症性 オンコピン:壊死性 ピラルピシン:壊死性 エンドキサン:炎症性</p>																																																																																																																			
<p>その他の 必要薬剤</p> <p>※day1: レスタミンコーワ3錠 アセトアミノフェン200mg アセトアミノフェン300mg</p>																																																																																																																						
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">モガムリズマブ+THP-COP療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ 1mg/kg</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン 1.4mg/m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ピノルビン 50mg/m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン 750mg/m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン 100mg/body</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			モガムリズマブ+THP-COP療法												治療日	1	2	3	4	5	6	..	..	..	..	21	ポテリジオ 1mg/kg	●											オンコピン 1.4mg/m <sup>2</sup>		●										ピノルビン 50mg/m <sup>2</sup>		●										エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup>		●										プレドニン 100mg/body	●	●	●	●	●							<p>day 2</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>プレドニン</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">分2 朝食後</td> </tr> </table> <p>点滴静注</p> <p>①</p> <table border="1"> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> </table> <p>↓</p> <p>②</p> <table border="1"> <tr> <td>グラニセトロン静注バッグ</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10:10- 全開で</td> </tr> </table> <p>↓</p> <p>③</p> <table border="1"> <tr> <td>オンコピン</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>50 ml</td> </tr> </table> <p>10:20- 全開で</p> <p>↓</p> <p>④</p> <table border="1"> <tr> <td>ピノルビン</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> </table> <p>点滴 10:30-11:00 30分</p> <p>↓</p> <p>⑤</p> <table border="1"> <tr> <td>エンドキサン</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250 ml</td> </tr> </table> <p>点滴 11:00-12:00 60分</p>		プレドニン	錠	分2 朝食後		生理食塩液	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		グラニセトロン静注バッグ	100 ml	10:10- 全開で		オンコピン	mg	生理食塩液	50 ml	ピノルビン	mg	生理食塩液	100 ml	エンドキサン	mg	生理食塩液	250 ml	<p>day 3-6</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>プレドニン</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">分2 朝食後</td> </tr> </table>		プレドニン	錠	分2 朝食後	
モガムリズマブ+THP-COP療法																																																																																																																						
治療日	1	2	3	4	5	6	..	..	..	..	21																																																																																																											
ポテリジオ 1mg/kg	●																																																																																																																					
オンコピン 1.4mg/m <sup>2</sup>		●																																																																																																																				
ピノルビン 50mg/m <sup>2</sup>		●																																																																																																																				
エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup>		●																																																																																																																				
プレドニン 100mg/body	●	●	●	●	●																																																																																																																	
プレドニン	錠																																																																																																																					
分2 朝食後																																																																																																																						
生理食塩液	100 ml																																																																																																																					
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																						
グラニセトロン静注バッグ	100 ml																																																																																																																					
10:10- 全開で																																																																																																																						
オンコピン	mg																																																																																																																					
生理食塩液	50 ml																																																																																																																					
ピノルビン	mg																																																																																																																					
生理食塩液	100 ml																																																																																																																					
エンドキサン	mg																																																																																																																					
生理食塩液	250 ml																																																																																																																					
プレドニン	錠																																																																																																																					
分2 朝食後																																																																																																																						
<p>投与時の 注意事項</p> <p>ポテリジオによるインフュー ジョンリアクションは、初回投 与時に発現しやすいため、投 与前、30分後、60分後、終了 時のバイタルサイン測定・症 状観察を行う。</p>			<p>備考欄</p> <p>7サイクル目以降はモガムリ ズマブ単独を2コース行う。</p>																																																																																																																			