

レジメン名 Pola+R-CHP療法 対象疾患 非ホジキンリンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫) 指示書2枚の内 No.1

ChemoNavi 治療内容

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>薬品名※()は成分名</th> <th>投与量</th> <th>治療日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ(リツキシマブ)</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)</td> <td>1.8mg/kg</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)</td> <td>50mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロフォスファミド)</td> <td>750mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン i.v.(プレドニゾロン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン p.o.(プレドニゾロン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day 3-6</td> </tr> </tbody> </table>	薬品名※()は成分名	投与量	治療日	リツキシマブ(リツキシマブ)	375mg/m ²	day1	ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)	1.8mg/kg	day2	ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)	50mg/m ²	day2	エンドキサン(シクロフォスファミド)	750mg/m ²	day2	プレドニン i.v.(プレドニゾロン)	100mg/body	day2	プレドニン p.o.(プレドニゾロン)	100mg/body	day 3-6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">投与 サイクル数</td> <td style="text-align: center;">6サイクル</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">総投与時間</td> <td style="text-align: center;">A設定: 約4時間 B設定: 約3時間</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">血管外漏出 リスク</td> <td style="text-align: center;">リツキシマブ: 非壊死性</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他 必要薬剤</td> <td style="text-align: center;">ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">投与時の 注意事項</td> <td style="text-align: center;">・day1: リツキシマブによるインフュージョン リアクション予防のため、点滴開始 時にロキソプロフェン60mg1錠、レ スタミンコーワ10mg3錠を内服</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">備考欄</td> <td style="text-align: center;">サイクル7, 8はリツキシマブの投与を考 慮</td> </tr> </table>	投与 サイクル数	6サイクル	総投与時間	A設定: 約4時間 B設定: 約3時間	血管外漏出 リスク	リツキシマブ: 非壊死性	その他 必要薬剤	ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠	投与時の 注意事項	・day1: リツキシマブによるインフュージョン リアクション予防のため、点滴開始 時にロキソプロフェン60mg1錠、レ スタミンコーワ10mg3錠を内服	備考欄	サイクル7, 8はリツキシマブの投与を考 慮	<p>day1</p> <p style="text-align: center;">* 内服</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">ロキソプロフェン 1錠</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">A設定 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">レスタミンコーワ 3錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">内服</td> <td style="text-align: center;">B設定 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">* 点滴</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">A設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定</p> <p style="text-align: center;">A設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>50ml/h ↓ (30分) 250ml/h ↓ (30分) 100ml/h ↓ (30分) 300ml/h ↓ (30分) 150ml/h ↓ (30分) 350ml/h ↓ (30分) 200ml/h ↓ (30分) 400ml/h</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">B設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定</p> <p style="text-align: center;">B設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>100ml/h (30分) ↓ 200ml/h (30分) ↓ 300ml/h (30分) ↓ 400ml/h</p> </td> </tr> </table>	①	ロキソプロフェン 1錠	A設定 <input type="checkbox"/>		レスタミンコーワ 3錠	内服		B設定 <input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">A設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定</p> <p style="text-align: center;">A設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>50ml/h ↓ (30分) 250ml/h ↓ (30分) 100ml/h ↓ (30分) 300ml/h ↓ (30分) 150ml/h ↓ (30分) 350ml/h ↓ (30分) 200ml/h ↓ (30分) 400ml/h</p>	<p style="text-align: center;">B設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定</p> <p style="text-align: center;">B設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>100ml/h (30分) ↓ 200ml/h (30分) ↓ 300ml/h (30分) ↓ 400ml/h</p>
薬品名※()は成分名	投与量	治療日																																											
リツキシマブ(リツキシマブ)	375mg/m ²	day1																																											
ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)	1.8mg/kg	day2																																											
ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)	50mg/m ²	day2																																											
エンドキサン(シクロフォスファミド)	750mg/m ²	day2																																											
プレドニン i.v.(プレドニゾロン)	100mg/body	day2																																											
プレドニン p.o.(プレドニゾロン)	100mg/body	day 3-6																																											
投与 サイクル数	6サイクル																																												
総投与時間	A設定: 約4時間 B設定: 約3時間																																												
血管外漏出 リスク	リツキシマブ: 非壊死性																																												
その他 必要薬剤	ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠																																												
投与時の 注意事項	・day1: リツキシマブによるインフュージョン リアクション予防のため、点滴開始 時にロキソプロフェン60mg1錠、レ スタミンコーワ10mg3錠を内服																																												
備考欄	サイクル7, 8はリツキシマブの投与を考 慮																																												
①	ロキソプロフェン 1錠	A設定 <input type="checkbox"/>																																											
	レスタミンコーワ 3錠																																												
内服		B設定 <input type="checkbox"/>																																											
<p style="text-align: center;">A設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定</p> <p style="text-align: center;">A設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>50ml/h ↓ (30分) 250ml/h ↓ (30分) 100ml/h ↓ (30分) 300ml/h ↓ (30分) 150ml/h ↓ (30分) 350ml/h ↓ (30分) 200ml/h ↓ (30分) 400ml/h</p>	<p style="text-align: center;">B設定</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>④ 生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定</p> <p style="text-align: center;">B設定</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>100ml/h (30分) ↓ 200ml/h (30分) ↓ 300ml/h (30分) ↓ 400ml/h</p>																																												

投与スケジュール

今回は
第 1 2 3 4 5 6 サイクル

Pola+R-CHP療法											
治療日	1	2	3	4	5	6	21			
リツキシマブ	●										
ポライビー		●									
ドキシソルピシン		●									
エンドキサン		●									
プレドニン i.v.		●									
プレドニン p.o.			●	●	●	●					

レジメン名 Pola+R-CHP療法 対象疾患 非ホジキンリンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫) 指示書2枚の内 No.2

ChemoNavi			治療内容																																																															
			day2	day3~6																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名※()は成分名</th> <th>投与量</th> <th>治療日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ(リツキシマブ)</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)</td> <td>1.8mg/kg</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)</td> <td>50mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロフォスファミド)</td> <td>750mg/m²</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン i.v.(プレドニゾロン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day2</td> </tr> <tr> <td>プレドニン p.o.(プレドニゾロン)</td> <td>100mg/body</td> <td>day 3-6</td> </tr> </tbody> </table>	薬品名※()は成分名	投与量	治療日	リツキシマブ(リツキシマブ)	375mg/m ²	day1	ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)	1.8mg/kg	day2	ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)	50mg/m ²	day2	エンドキサン(シクロフォスファミド)	750mg/m ²	day2	プレドニン i.v.(プレドニゾロン)	100mg/body	day2	プレドニン p.o.(プレドニゾロン)	100mg/body	day 3-6	<p>投与 サイクル数</p> <p>6サイクル</p>	<p>総投与時間</p> <p>day2: 1サイクル目 4時間 2サイクル目 3時間</p>	<p>* 内服</p> <p>① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服</p>																																										
薬品名※()は成分名	投与量	治療日																																																																
リツキシマブ(リツキシマブ)	375mg/m ²	day1																																																																
ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)	1.8mg/kg	day2																																																																
ドキシソルピシン(ドキシソルピシン)	50mg/m ²	day2																																																																
エンドキサン(シクロフォスファミド)	750mg/m ²	day2																																																																
プレドニン i.v.(プレドニゾロン)	100mg/body	day2																																																																
プレドニン p.o.(プレドニゾロン)	100mg/body	day 3-6																																																																
<p>投与スケジュール</p> <p>今回は 第 1 2 3 4 5 6 サイクル</p>	<p>血管外漏出 リスク</p> <p>ポライビー: 不明 オンコビン 壊死性 ドキシソルピシン 壊死性 エンドキサン 炎症性</p>	<p>② 生理食塩液 ml ルート確保・フラッシュ用</p>	<p>* 内服</p> <p>① プレドニン 錠 内服</p>																																																															
<p>Pola+R-CHP療法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>.....</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポライビー</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキシソルピシン</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン i.v.</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン p.o.</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	治療日	1	2	3	4	5	6	21	リツキシマブ	●								ポライビー		●							ドキシソルピシン		●							エンドキサン		●							プレドニン i.v.		●							プレドニン p.o.			●	●	●	●			<p>その他 必要薬剤</p> <p>ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠</p>	<p>③ グラニセトロン注(3mg/50ml)1袋 点滴、全開</p>	
治療日	1	2	3	4	5	6	21																																																										
リツキシマブ	●																																																																	
ポライビー		●																																																																
ドキシソルピシン		●																																																																
エンドキサン		●																																																																
プレドニン i.v.		●																																																																
プレドニン p.o.			●	●	●	●																																																												
	<p>投与時の 注意事項</p> <p>・day2: ポライビーによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服</p> <p>※ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)は初回投与時90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降は30分まで短縮できる。</p> <p>・ポライビー(ポラツズマブ・ベドチン)はフィルター付きルート要</p>	<p>④ 生理食塩液 100 ml 水溶性プレドニン 100 mg 点滴、30分</p>																																																																
	<p>備考欄</p> <p>サイクル7, 8はリツキシマブの投与を考慮</p>	<p>⑤ ポライビー mg 生理食塩液 100 ml 初回90分、2回目以降30分※</p>																																																																
		<p>⑥ 生理食塩液 50 ml 点滴、15分</p>																																																																
		<p>⑦ ドキシソルピシン mg 生理食塩液 50 ml 点滴、30分</p>																																																																
		<p>⑧ エンドキサン mg 生理食塩液 250 ml 点滴、60分</p>																																																																