

レジメン名 DCyBorD療法(sc. 1-2サイクル目) 対象疾患 ALアミロイドーシス

ChemoNavi		投与		治療内容																																																																												
★DCyBorD療法(sc. 1-2サイクル目)		投与サイクル数	★最大2サイクル	day1、8、15、22	day2、9、16、23																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ(ダラツムマブ)</td> <td>1800mg</td> <td>day1、8、15、22</td> </tr> <tr> <td>ベルケイド(ボルテゾミブ)</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1、8、15、22</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>300mg/m²*</td> <td>day1、8、15、22</td> </tr> <tr> <td>デカドロン(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1、2、8、9、15、16、22、23</td> </tr> </tbody> </table> <p>* エンドキサンの最大絶対週間投与量は500mg/bodyまで。</p>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1、8、15、22	ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3mg/m ²	day1、8、15、22	エンドキサン(シクロホスファミド)	300mg/m ² *	day1、8、15、22	デカドロン(デキサメタゾン)	20mg/body	day1、2、8、9、15、16、22、23	総投与時間	day1、8、15、22:1時間10分	内服 <table border="1"> <tr> <td>デカドロン</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>		デカドロン	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200mg	1錠	アセトアミノフェン錠300mg	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝																																															
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																														
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1、8、15、22																																																																														
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3mg/m ²	day1、8、15、22																																																																														
エンドキサン(シクロホスファミド)	300mg/m ² *	day1、8、15、22																																																																														
デカドロン(デキサメタゾン)	20mg/body	day1、2、8、9、15、16、22、23																																																																														
デカドロン	錠																																																																															
分1朝																																																																																
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																																																															
アセトアミノフェン錠200mg	1錠																																																																															
アセトアミノフェン錠300mg	1錠																																																																															
モンテルカスト 10mg	1錠																																																																															
分1朝																																																																																
		血管外漏出リスク	エンドキサン 炎症性	点滴注射 <table border="1"> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> </table> ↓ <table border="1"> <tr> <td>グラニセトロン注(3mg/50ml)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、全開</td> <td></td> </tr> </table> ↓ <table border="1"> <tr> <td>エンドキサン</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>点滴、60分</td> <td></td> </tr> </table>		生理食塩液	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		グラニセトロン注(3mg/50ml)		点滴、全開		エンドキサン	mg	生理食塩液	250 ml	点滴、60分																																																														
生理食塩液	100 ml																																																																															
ルート確保・フラッシュ用																																																																																
グラニセトロン注(3mg/50ml)																																																																																
点滴、全開																																																																																
エンドキサン	mg																																																																															
生理食塩液	250 ml																																																																															
点滴、60分																																																																																
		調製時の注意事項	<p><ダラキューロ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後使用。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。 	皮下注射 <table border="1"> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ベルケイド</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>		ダラキューロ	1800mg	腹部に皮下注		ベルケイド	mg	生理食塩液	ml	腹部に皮下注																																																																		
ダラキューロ	1800mg																																																																															
腹部に皮下注																																																																																
ベルケイド	mg																																																																															
生理食塩液	ml																																																																															
腹部に皮下注																																																																																
投与スケジュール <table border="1"> <thead> <tr> <th>★DCyBorD療法(sc. 1-2サイクル目)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ベルケイド</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デカドロン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		★DCyBorD療法(sc. 1-2サイクル目)	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	28	ダラキューロ	●			●			●			●					ベルケイド	●			●			●			●					エンドキサン	●			●			●			●					デカドロン	●	●		●	●		●	●		●	●				投与時の注意事項	<p><ダラキューロ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・デカドロン、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1~3時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。 <p><ベルケイド(ボルテゾミブ)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・腹部に皮下注射する。 ・投与部位は前回と同じ位置への投与を避ける。 ・溶解後8時間以内に使用すること。 ・腹部皮下に投与する。 <p>・上記2剤は同一部位に投与しない。</p>	備考欄 ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。	
★DCyBorD療法(sc. 1-2サイクル目)	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	28																																																																		
ダラキューロ	●			●			●			●																																																																						
ベルケイド	●			●			●			●																																																																						
エンドキサン	●			●			●			●																																																																						
デカドロン	●	●		●	●		●	●		●	●																																																																					

レジメン名 DCyBorD療法(sc. 3-6サイクル目) 対象疾患 ALアミロイドーシス

ChemoNavi	投与サイクル数		治療内容																																																																										
	★最大4サイクル	day1、15	day 8、22																																																																										
<p>★DCyBorD療法(sc. 3-6サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ(ダラツムマブ)</td> <td>1800mg</td> <td>day1, 15</td> </tr> <tr> <td>ベルケイド(ボルテゾミブ)</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>300mg/m²*</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>デカドロン(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23</td> </tr> </tbody> </table> <p>* エンドキサンの最大絶対週間投与量は500mg/bodyまで。</p>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1, 15	ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	エンドキサン(シクロホスファミド)	300mg/m ² *	day1, 8, 15, 22	デカドロン(デキサメタゾン)	20mg/body	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	<p>総投与時間</p> <p>day1、8、15、22:1時間10分</p>	<p>★最大4サイクル</p> <p>day1、8、15、22:1時間10分</p>	<p>day1、15</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>デカドロン</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>レスタミンコーワ錠10mg 3錠 アセトアミノフェン錠200mg 1錠 アセトアミノフェン錠300mg 1錠 モンテルカスト 10mg 1錠 分1朝</p> <p>点滴注射</p> <table border="1"> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> </table> <p>↓</p> <table border="1"> <tr> <td>グラニセトロン注(3mg/50ml)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、全開</td> <td></td> </tr> </table> <p>↓</p> <table border="1"> <tr> <td>エンドキサン</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>点滴、60分</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table> <p>ベルケイド mg 生理食塩液 ml 腹部に皮下注</p>	デカドロン	錠	分1朝		生理食塩液	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		グラニセトロン注(3mg/50ml)		点滴、全開		エンドキサン	mg	生理食塩液	250 ml	点滴、60分		ダラキューロ	1800mg	腹部に皮下注		<p>day 8、22</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>デカドロン</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>点滴注射</p> <table border="1"> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100 ml</td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> </table> <p>↓</p> <table border="1"> <tr> <td>グラニセトロン注(3mg/50ml)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点滴、全開</td> <td></td> </tr> </table> <p>↓</p> <table border="1"> <tr> <td>エンドキサン</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>点滴、60分</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>ベルケイド</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>ml</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	デカドロン	錠	分1朝		生理食塩液	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		グラニセトロン注(3mg/50ml)		点滴、全開		エンドキサン	mg	生理食塩液	250 ml	点滴、60分		ベルケイド	mg	生理食塩液	ml	腹部に皮下注													
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																											
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1, 15																																																																											
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22																																																																											
エンドキサン(シクロホスファミド)	300mg/m ² *	day1, 8, 15, 22																																																																											
デカドロン(デキサメタゾン)	20mg/body	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23																																																																											
デカドロン	錠																																																																												
分1朝																																																																													
生理食塩液	100 ml																																																																												
ルート確保・フラッシュ用																																																																													
グラニセトロン注(3mg/50ml)																																																																													
点滴、全開																																																																													
エンドキサン	mg																																																																												
生理食塩液	250 ml																																																																												
点滴、60分																																																																													
ダラキューロ	1800mg																																																																												
腹部に皮下注																																																																													
デカドロン	錠																																																																												
分1朝																																																																													
生理食塩液	100 ml																																																																												
ルート確保・フラッシュ用																																																																													
グラニセトロン注(3mg/50ml)																																																																													
点滴、全開																																																																													
エンドキサン	mg																																																																												
生理食塩液	250 ml																																																																												
点滴、60分																																																																													
ベルケイド	mg																																																																												
生理食塩液	ml																																																																												
腹部に皮下注																																																																													
<p>投与スケジュール</p> <p>★DCyBorD療法(sc. 3-6サイクル目)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ベルケイド</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デカドロン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	ダラキューロ	●						●							ベルケイド	●			●			●			●				エンドキサン	●			●			●			●				デカドロン	●	●		●	●		●	●		●	●			<p>調製時の注意事項</p> <p><ダラキューロ> ・使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後使用。 ・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。</p> <p><ダラキューロ> ・デカドロン、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1~3時間前に内服する。 ・注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射をシリンジに取り付ける。 ・調製後、4時間以内に使用する。 ・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 ・同一部位への反復注射は行わないこと。</p> <p><ベルケイド(ボルテゾミブ)> ・腹部に皮下注射する。 ・投与部位は前回と同じ位置への投与を避ける。 ・溶解後8時間以内に使用すること。 ・腹部皮下に投与する。 ・上記2剤は同一部位に投与しない。</p>	<p>投与時の注意事項</p> <p>ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。</p>	<p>day 2、9、16、23</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>デカドロン</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table>	デカドロン	錠	分1朝	
	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28																																																																
ダラキューロ	●						●																																																																						
ベルケイド	●			●			●			●																																																																			
エンドキサン	●			●			●			●																																																																			
デカドロン	●	●		●	●		●	●		●	●																																																																		
デカドロン	錠																																																																												
分1朝																																																																													

レジメン名 DCyBorD療法(sc. 7サイクル目以降) 対象疾患 ALアミロイドーシス

ChemoNavi		投与		治療内容																																									
<p>★DCyBorD療法(sc. 7サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ(ダラツムマブ)</td> <td>1800mg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>デカドロン(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1</td> </tr> </tbody> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1	デカドロン(デキサメタゾン)	20mg/body	day1	投与サイクル数	18サイクルまで	<p>day1</p> <p>内服</p> <table border="1"> <tr> <td>デカドロン</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠200mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠300mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>モンテルカスト 10mg</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td>分1朝</td> <td></td> </tr> </table> <p>皮下注射</p> <table border="1"> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>1800mg</td> </tr> <tr> <td>腹部に皮下注</td> <td></td> </tr> </table>	デカドロン	錠	分1朝		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	アセトアミノフェン錠200mg	1錠	アセトアミノフェン錠300mg	1錠	モンテルカスト 10mg	1錠	分1朝		ダラキューロ	1800mg	腹部に皮下注															
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																											
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg	day1																																											
デカドロン(デキサメタゾン)	20mg/body	day1																																											
デカドロン	錠																																												
分1朝																																													
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																												
アセトアミノフェン錠200mg	1錠																																												
アセトアミノフェン錠300mg	1錠																																												
モンテルカスト 10mg	1錠																																												
分1朝																																													
ダラキューロ	1800mg																																												
腹部に皮下注																																													
投与スケジュール		総投与時間	皮下注射																																										
<p>★DCyBorD療法(sc. 7サイクル目以降)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラキューロ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デカドロン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	ダラキューロ	●													デカドロン	●													血管外漏出リスク	
	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28																																
ダラキューロ	●																																												
デカドロン	●																																												
		調製時の注意事項	<p><ダラキューロ></p> <ul style="list-style-type: none"> 使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後使用。 翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。 																																										
		投与時の注意事項	<p><ダラキューロ></p> <ul style="list-style-type: none"> デカドロン、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。 注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射針をシリンジに取り付ける。 調製後、4時間以内に使用する。 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。 同一部位への反復注射は行わないこと。 																																										
		備考欄	ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。																																										