

がん化学療法指示書

登録番号 390

登録日 2024/4/8

レジメン名	PHES療法(1コース目)
診療科・対象疾患	(外)HER2陽性の乳がん
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	1コース (術前・術後薬物療法の場合は12ヶ月・計18コースまで)

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
フェスコ配合皮下注IN	ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼアルファ	15mL(1瓶)	day1

治療内容	投与スケジュール	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
								day1	...	...	...	...	...	day21		
注射	Rp1	癌	フェスコ配合皮下注IN	15mL	8分以上	皮下注	●									
内服																
その他必要薬剤																
総投与時間	皮下注(8分以上かけて)															
血管外漏出リスク	皮下注															
調製時の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用する前に冷蔵庫から取り出し、室温に戻す。</li> <li>翼状針使用のため1瓶全量抜き取る。</li> </ul>															
投与時の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>25Gの翼状針を使用。</li> <li>2mL/min以下の速度で8分以上かけて皮下注。</li> <li>投与部位は大腿部のみ。前回の注射部位から少なくとも2.5cm離れた部位に投与。</li> <li>皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)は投与を避けること。</li> <li>調製後、4時間以内に使用する。</li> <li>投与後30分間、経過観察が必要。</li> </ul>															
備考欄	<ul style="list-style-type: none"> <li>心機能障害が現れることがあるので、投与開始前には必ず心機能を確認し、投与中も適宜心機能検査(心エコー等)を行い、患者の状態を十分に観察すること。</li> </ul>															

