

がん化学療法指示書

登録番号 394

登録日 2024/5/15

レジメン名	CBDCA+nab-PTX+Bmab療法
診療科・対象疾患	(呼)非小細胞肺がん
投与間隔	3週間
投与サイクル数	4～6コース

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=6	day1
ペバシズマブBS	ペバシズマブ	15mg/kg	day1

治療内容	投与経路	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール											
								day1	...	day8	...	day15	...	day21					
治療内容	注射			Rp1	生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●										
				Rp2	パロノセトロン0.75mg/50mL デキサート6.6mg/2mL	1袋 1瓶	15分	点滴静注メイン	●										
				Rp3	生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●										
			癌	アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル) ※生理食塩液は溶解に必要な量のみ使用する	100mg/m ²														
				Rp4	生理食塩液	50mL	15分	点滴静注メイン	●										
			癌	生理食塩液 カルボプラチン	250mL AUC6	60分	点滴静注メイン	●											
				Rp6	生理食塩液	100mL	90分※1	点滴静注メイン	●										
			癌	ペバシズマブBS	15mg/kg		総量100mLに												
			内服																
		その他必要薬剤	<ul style="list-style-type: none"> ・アブレピタント125mg: 1cap分1 ルートキープ時に内服(day1) ・アブレピタント80mg: 1cap分1 朝食後に内服(day2,3) 																
		総投与時間	Day1: (初回)3時間40分、(2回目・忍容性良好の場合)3時間10分、(3回目以降・忍容性良好の場合)2時間40分、Day8,15: 1時間																
		血管外漏出リスク	アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル): 壊死性抗がん剤 カルボプラチン: 炎症性抗がん剤 ペバシズマブBS: 非壊死性抗がん剤																
投与時の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)は特定生物由来製剤(人血清アルブミン含有)であり特定生物由来製剤使用同意書が必要 ・アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)はフィルター付きルートが使用不可 <p>※1・・・ペバシズマブBSの投与速度: 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与時間は60分、3回目以降は30分まで短縮できる。</p>																		
備考欄																			