

がん化学療法指示書

登録番号 395

登録日 2024/5/15

| | |
|----------|------------------|
| レジメン名 | nab-PTX+Bmab維持療法 |
| 診療科・対象疾患 | (呼)非小細胞肺がん |
| 投与間隔 | 3週間 |
| 投与サイクル数 | PDになるまで |

Chemo Navi

| 薬剤名 | 成分名 | 投与量 | 投与日 |
|----------|-----------------|----------------------|-----------|
| アブラキサン | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100mg/m ² | day1,8,15 |
| ペバシズマブBS | ペバシズマブ | 15mg/kg | day1 |

| 治療内容 | 投与経路 | 滴下順 | 抗癌剤 | 薬剤(成分名) | 投与量 | 時間 | 投与方法 | 投与スケジュール | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----|---|----------------------|-------|--------------|----------|-----|------|-----|-------|-----|-------|--|--|
| | | | | | | | | day1 | ... | day8 | ... | day15 | ... | day21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療内容 | 注射 | Rp1 | | 生理食塩液 | 100mL | 任意 | ルート確保・フラッシュ用 | ● | | | | | | | | |
| | | Rp2 | | 生理食塩液 デキサート6.6mg/2mL | 100mL 1瓶 | 15分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | |
| | | Rp3 | | 生理食塩液 | 100mL | 30分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | |
| | | | 癌 | アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル) ※生理食塩液は溶解に必要な量のみ使用する | 100mg/m ² | | | | | | | | | | | |
| | | Rp4 | | 生理食塩液 | 50mL | 15分 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | |
| | | Rp5 | | 生理食塩液 | 100mL | 90分※1 | 点滴静注メイン | ● | | | | | | | | |
| | | | 癌 | ペバシズマブBS | 15mg/kg | | | 総量100mLに | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 内服 | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他必要薬剤 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総投与時間 | Day1:(初回)2時間40分、(2回目・忍容性良好の場合)2時間10分、(3回目以降・忍容性良好の場合)1時間40分、Day8,15:1時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血管外漏出リスク | アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル):壊死性抗がん剤 ペバシズマブBS:非壊死性抗がん剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与時の注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)は特定生物由来製剤(人血清アルブミン含有)であり特定生物由来製剤使用同意書が必要 アブラキサン(アルブミン懸濁型パクリタキセル)はフィルター付きルートが使用不可 ※1...ペバシズマブBSの投与速度:初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与時間は60分、3回目以降は30分まで短縮できる。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考欄 | | | | | | | | | | | | | | | | |