

がん化学療法指示書

登録番号 396

登録日 2024/5/15

レジメン名	CBDCA+S-1+Bmab療法
診療科・対象疾患	(呼)非小細胞肺がん
投与間隔	3週間
投与サイクル数	4~6コース

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
エスワン	テガフル・ギメランル・オテラシルカリウム	80~120mg/日	day1~14
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=5	day1
ペバシズマブBS	ペバシズマブ	15mg/kg	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day21	
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
		Rp2	パロノセトロン0.75mg/50mL デキサート6.6mg/2mL	1袋 1瓶	15分	点滴静注メイン	●							
		Rp3	生理食塩液 癌 カルボプラチン	250mL AUC5	60分	点滴静注メイン	●							
		Rp4	生理食塩液 癌 ペバシズマブBS	100mL 15mg/kg	90分※1	点滴静注メイン 総量100mLに	●							
内服	エスワン(S-1):朝、夕食後に1日2回内服(day1~day14) 【S-1(エスワン)投与量(1回量)】 体表面積1.25㎡未満・・・40mg/回 体表面積1.25㎡-1.50㎡・・・50mg/回 体表面積1.50㎡以上・・・60mg/回													
その他必要薬剤	・アプレピタント125mg:1cap分1 ルートキープ時に内服(day1) ・アプレピタント80mg:1cap分1 朝食後に内服(day2,3)													
総投与時間	初回:2時間55分、2回目(忍容性良好の場合):2時間25分、3回目以降(忍容性良好の場合):1時間55分													
血管外漏出リスク	カルボプラチン:炎症性抗がん剤 ペバシズマブBS:非壊死性抗がん剤													
投与時の注意事項	※1・・・ペバシズマブBSの投与速度:初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与時間は60分、3回目以降は30分まで短縮できる。													
備考欄														