

がん化学療法指示書

登録番号

4

作成日

2022/7/13

レジメン名	m-FOLFOX6療法
診療科・対象疾患	外)進行大腸癌1st、外)進行大腸癌2nd 外)術後補助大腸癌(6ヶ月) 外)切除不能進行・再発胃癌 外)小腸・十二指腸癌
投与間隔	2週間
投与サイクル数	PDになるまで (術後補助の場合は6ヶ月)

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オキサリプラチン	オキサリプラチン	85mg/m ²	day1
フルオロウラシル(急速静注)	フルオロウラシル	400mg/m ²	day1
フルオロウラシル(持続点滴)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1~3

治療内容	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day2	day3	day14	
注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
	Rp2		パロノセトロン	1袋	15分	点滴静注メイン	●							
			デキサート(6.6mg)	1管										
	Rp3		レボホリナート	200mg/m ²	120分	点滴静注側管	●							
			5%ブドウ糖液	250mL										
			Rp.3とRp.4は同時に投与											
	Rp4	癌	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	点滴静注メイン	●							
			5%ブドウ糖液	250mL										
			Rp.3とRp.4は同時に投与											
	Rp5	癌	フルオロウラシル	400mg/m ²	10分	点滴静注メイン	●							
			生理食塩液	100mL										
			Rp.3とRp.4両方終了してから投与 ※1(投与の注意事項参照)											
	Rp6	癌	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	持続点滴	●	●	●					
			生理食塩液	200mL										
		ヘパリンNa	1mL											
		総量を140mLにする												
	Rp7		ヘパリンロックNaロック用100単位/mL シリンジ	1筒		ワンショット			●					
			抜針用											
内服														
その他必要薬剤														
総投与時間	day1:2時間30分(フルオロウラシルの持続点滴を除く) day1~3:46時間(フルオロウラシルの持続点滴のみ)													
血管外漏出リスク	オキサリプラチン:炎症性抗がん剤 5-FU:炎症性抗がん剤													
投与時の注意事項	※1.Rp.5終了後、ルート確保用の生理食塩液を5分間流す													
備考欄														