

## がん化学療法指示書

登録番号 400

作成日 2024/8/7

レジメン名	PEM+オシメルチニブ維持療法
診療科・対象疾患	(呼)EGFR遺伝子変異陽性の進行・再発非小細胞肺癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDになるまで

## Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ペムレキセド	ペムレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1
タグリツソ	オシメルチニブ	80mg/日	day1-21

治療内容	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール					
							day1	...	...	...	...	...
注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●					
	Rp2		生理食塩液 デキサート6.6mg/2mL	100mL 1瓶	15分	点滴静脈メイン	●					
	Rp3	癌	ペムレキセド 生理食塩液 総量100mLにする	500mg/m <sup>2</sup> 100mL	10分	点滴静脈メイン	●					
内服			タグリツソ(オシメルチニブ):80mg/日、day1-21に内服									
その他必要薬剤	・デカドロン(デキサメタゾン)4mg:2錠分1 朝食後に内服(day2,3) ・葉酸:1日1回0.5mg(パンピタン末1g)を初回治療の7日前から服用し、最終治療21日後まで連日服用 ・ビタミンB12:1mg(メコバラミン注500μg 2A)を初回治療1週間前および以降は9週間毎に筋肉注射、その後ペムレキセド最終投与日から22日目まで9週間毎に筋注											
総投与時間	30分											
血管外漏出リスク	ペムレキセド:非壊死性抗がん剤											
投与時の注意事項	ペムレキセドはNSAIDsとの併用注意(ペムレキセドの血中濃度が増加し副作用が増強される可能性がある)											
備考欄												