

ChemoNavi			投与 サイクル 数	1コース	治療内容																											
薬品名※()は成分名	投与量	投与日			day 1	day 2,3	day 8, 15, 22																									
プレドニン(プレドニゾン)*1	60mg/m <sup>2</sup>	day1~21	総投与時間 day1:4時間30分 day2,3:1時間20分 day8,15,22:30分	血管外漏出 リスク	点滴静注 ①生理食塩液 100mL 10:00~ ルート確保・フラッシュ用 ↓ ②グラニセトロン静注バッグ 50mL 10:10~ 全開 ↓ ③オンコピン 50mL 生理食塩液 50mL 10:20~ 全開 ↓ ④ダウノマイシン 100mL 生理食塩液 100mL 10:30~11:30 1時間 ↓ ⑤エンドキサン 500mL 生理食塩液 500mL 11:30~14:30 3時間	点滴静注 ①生理食塩液 100mL 10:00~ ルート確保・フラッシュ用 ↓ ②グラニセトロン静注バッグ 50mL 10:10~ 全開 ↓ ③ダウノマイシン 100mL 生理食塩液 100mL 10:20~11:20 1時間	点滴静注 ①生理食塩液 100mL 10:00~ ルート確保・フラッシュ用 ↓ ②グラニセトロン静注バッグ 50mL 10:10~ 全開 ↓ ③オンコピン 50mL 生理食塩液 50mL 10:20~ 全開																									
エンドキサン(シクロホスファミド)	1200mg/m <sup>2</sup>	day1																														
ダウノマイシン(ダウノルビジン)	45mg/m <sup>2</sup>	day1~3																														
オンコピン(ピンクリスチン)*2	1.3mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15, 22																														
スプリセル(ダサチニブ)	100mg/body	day4~31																														
*1 Day22~28日に漸減、終了 *2 最大量2mg/body 寛解導入1は内服でステロイド、ダサチニブを使用																																
投与スケジュール			投与時の 注意事項	備考欄	day 1~21	day 4~31																										
JALSG-Ph+ALL213寛解導入療法2(60歳未満)					内服 プレドニン 錠 分2 朝昼	内服 スプリセル 錠 分1 朝																										
治療日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
プレドニン 60mg/m <sup>2</sup> *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エンドキサン 1200mg/m <sup>2</sup>	●																															
ダウノマイシン 45mg/m <sup>2</sup>	●	●	●																													
オンコピン 1.3mg/m <sup>2</sup> *2	●						●																●									
スプリセル100mg/body				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
*1 Day22~28日に漸減、終了 *2 最大量2mg/body																																