

ChemoNavi			治療内容																																																																																																																																																																																																						
			day1	day2	day3	day4																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>メトトレキサート(メトトレキサート)</td> <td>1g/m²/24h (0.2g/m²/2h 0.8g/m²/22h)</td> <td>day1~2</td> </tr> <tr> <td>キロサイド(シタラビン)</td> <td>1g/m²/3h × 2</td> <td>day2, 3</td> </tr> <tr> <td>ソル・メドロール(メチルプレドニン)</td> <td>50mg/body × 2</td> <td>day1~3</td> </tr> <tr> <td>スプリセル(ダサテニブ)</td> <td>100mg/body</td> <td>day4~24</td> </tr> </tbody> </table>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	メトトレキサート(メトトレキサート)	1g/m ² /24h (0.2g/m ² /2h 0.8g/m ² /22h)	day1~2	キロサイド(シタラビン)	1g/m ² /3h × 2	day2, 3	ソル・メドロール(メチルプレドニン)	50mg/body × 2	day1~3	スプリセル(ダサテニブ)	100mg/body	day4~24	<p>投与サイクル数</p> <p>4コース</p> <p>総投与時間</p> <p>持続静脈注射・内服 24時間 × 4日間</p> <p>血管外漏出リスク</p> <p>メトトレキサート (メトトレキサート) :非壊死抗がん剤 シタラビン :非壊死性抗がん剤</p>	<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="28">JALSG-Ph+ALL213地固め療法1(60歳以上)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>..</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>..</th><th>28</th> <th colspan="16"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>メトトレキサート 1g/m²</td> <td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>キロサイド 1g/m² × 2回</td> <td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>ソル・メドロール 50mg × 2回</td> <td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>スプリセル 100mg</td> <td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table>	JALSG-Ph+ALL213地固め療法1(60歳以上)																												治療日	1	2	3	4	5	6	..	22	23	24	..	28																	メトトレキサート 1g/m ²	●																													キロサイド 1g/m ² × 2回	●	●																												ソル・メドロール 50mg × 2回	●	●																												スプリセル 100mg				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<p>投与時の注意事項</p> <p>・メトトレキサート投与終了12時間後にレボホリナートを7.5mg投与、以後6時間ごとにレボホリナート7.5mgを7回投与する。</p> <p>・ソル・メドロールとレボホリナートの前後に生理食塩液でフラッシュする。</p>	<p>備考欄</p> <p>・メトトレキサート投与終了後、24時間後、48時間後にメトトレキサート血中濃度測定する。</p> <p>・原のアルカリ化の確認 day1-5 原pH7以上であること確認する。 原pH7未満ならメイロン(20)1A追加</p>	<p>その他薬剤</p> <p>・原のアルカリ化のため、ダイアモックス錠250mg、2錠分2朝夕食後、day1-4内服</p> <p>・シタラビンの髄液炎予防のため、day2-8までフルメトロン点眼実施</p>	<p>day1</p> <p>① KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 6:00~12:00 6時間</p> <p>別ルートから投与</p> <p>② 生理食塩液 100mL 10:00~ルート確保用</p> <p>③ グラニセトロン注3mg/50mL 1袋 ソル・メドロール 50mg 10:00~全開</p> <p>④ メトトレキサート mg 5%ブドウ糖液 500mL 点滴 10:00~12:00 2時間</p> <p>⑤ YDソリタT1 500mL メイロン 40mL 点滴 12:00~18:00 6時間</p> <p>別ルートから投与</p> <p>⑥ メトトレキサート mg 5%ブドウ糖液 500mL 点滴 12:00~24:00 12時間</p> <p>⑦ KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 18:00~24:00 6時間</p> <p>⑧ ソル・メドロール 50mg 生理食塩液 50mL 点滴 22:00~22:15 15分</p>	<p>day2</p> <p>① KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 0:00~12:00 12時間</p> <p>別ルートから投与</p> <p>② メトトレキサート mg 5%ブドウ糖液 500mL 点滴 0:00~10:00 10時間</p> <p>③ グラニセトロン注3mg/50mL 1袋 ソル・メドロール 50mg 10:00~全開</p> <p>④ シタラビン mg 5%ブドウ糖液 400mL 点滴 10:00~13:00 3時間</p> <p>⑤ 生理食塩液 50mL 13:00~フラッシュ用</p> <p>⑥ KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 12:00~24:00 12時間</p> <p>⑦ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 22:00~注射</p> <p>別ルートから投与</p> <p>⑧ 生理食塩液 100mL 22:00~ルート確保・フラッシュ用</p> <p>⑨ グラニセトロン注3mg/50mL 1袋 ソル・メドロール 50mg 22:00~全開</p> <p>⑩ シタラビン mg 5%ブドウ糖液 400mL 点滴 22:00~25:00 3時間</p> <p>採血 MTX終了温度 10:00 (基準値: ≤20 μmol/L)</p>	<p>day3</p> <p>① KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 0:00~12:00 12時間</p> <p>② レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 4:00~注射</p> <p>③ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 10:00~注射</p> <p>別ルートから投与</p> <p>④ 生理食塩液 100mL 10:00~ルート確保・フラッシュ用</p> <p>⑤ グラニセトロン注3mg/50mL 1袋 ソル・メドロール 50mg 10:00~全開</p> <p>⑥ シタラビン mg 5%ブドウ糖液 400mL 点滴 10:00~13:00 3時間</p> <p>⑦ KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 12:00~24:00 12時間</p> <p>⑧ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 18:00~注射</p> <p>⑨ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 22:00~注射</p> <p>別ルートから投与</p> <p>⑩ 生理食塩液 100mL 22:00~ルート確保・フラッシュ用</p> <p>⑪ グラニセトロン注3mg/50mL 1袋 ソル・メドロール 50mg 22:00~全開</p> <p>⑫ シタラビン mg 5%ブドウ糖液 400mL 点滴 22:00~25:00 3時間</p> <p>採血 MTX終了24時間後温度 10:00 (基準値: 1 μmol/L)</p>	<p>day4</p> <p>① KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 0:00~12:00 12時間</p> <p>② レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 4:00~注射</p> <p>③ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 10:00~注射</p> <p>④ KN3号液 500mL メイロン 40mL 点滴 12:00~24:00 12時間</p> <p>⑤ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 朝 18:00~注射</p> <p>採血 MTX終了48時間後温度 10:00 (基準値: ≤0.1 μmol/L)</p>
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																																																																																																																							
メトトレキサート(メトトレキサート)	1g/m ² /24h (0.2g/m ² /2h 0.8g/m ² /22h)	day1~2																																																																																																																																																																																																							
キロサイド(シタラビン)	1g/m ² /3h × 2	day2, 3																																																																																																																																																																																																							
ソル・メドロール(メチルプレドニン)	50mg/body × 2	day1~3																																																																																																																																																																																																							
スプリセル(ダサテニブ)	100mg/body	day4~24																																																																																																																																																																																																							
JALSG-Ph+ALL213地固め療法1(60歳以上)																																																																																																																																																																																																									
治療日	1	2	3	4	5	6	..	22	23	24	..	28																																																																																																																																																																																													
メトトレキサート 1g/m ²	●																																																																																																																																																																																																								
キロサイド 1g/m ² × 2回	●	●																																																																																																																																																																																																							
ソル・メドロール 50mg × 2回	●	●																																																																																																																																																																																																							
スプリセル 100mg				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																												
day1-5 尿pH測定実施																																																																																																																																																																																																									
day4-24																																																																																																																																																																																																									
<p>内服</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>スプリセル 錠 分1朝</p> </div>																																																																																																																																																																																																									