登録番号　405　　大阪鉄道病院

レジメン名　JALSG-Ph+ALL213地固め療法2　　対象疾患　急性リンパ性白血病　　登録日　2024年8月28日

ChemoNavi

薬品名※()は成分名	投与量	投与日
プレドニン(プレドニゾロン)*1	60mg/m²	day1～7
エンドキサン(シクロフォスファミド)	1200mg/m²	day1
ダウノマイシン(ダウノルビシン)	45mg/m²	day1
オンコビン(ビンクリスチン)*2	1.3mg/m²	day1
スプリセル(ダサチニブ)	100mg/body	day2～22

*1 Day8～14日に漸減、終了。
*2 最大量2mg/body

投与スケジュール

JALSG-Ph+ALL213地固め療法2

治療日	1	2	3	4	･･	7	8	9	10	11	12	13	14	15	･･･	21	22	23	･･･	28
プレドニン 60mg/m2*1	●	●	●	●	●	●	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1							
エンドキサン 1200mg/m2	●																			
ダウノマイシン 45mg/m2	●																			
オンコビン 1.3mg/m2*2	●																			
スプリセル100mg/body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

*1 Day8～14日に漸減、終了。
*2 最大量2mg/body

投与サイクル数	4コース
総投与時間	day1 4時間30分
血管外漏出リスク	エンドキサン：炎症性 ダウノマイシン：壊死性 オンコビン：壊死性
投与時の注意事項	
備考欄	Day1に中枢神経予防としてメソトレキセート15mg＋デキサメタゾン3.3mgの髄腔内注射を考慮

治療内容

day 1

点滴静注

① 生理食塩液　100mL
10:00～ ルート確保・フラッシュ用
↓
② グラニセトロン静注バッグ　50mL
10:10～　全開
↓
③ オンコビン　mg
生理食塩液　50mL
10:20～　全開
↓
④ ダウノマイシン　mg
生理食塩液　100mL
10：30～11：30　1時間
↓
⑤ エンドキサン　mg
生理食塩液　500mL
11:30～14：30　3時間

day 1－7

内服
プレドニン　錠
分2　朝昼

day 2～22

内服
スプリセル　錠
分1　朝