がん化学療法指示書

登録番号　407
登録日　2024/9/30

レジメン名	CDDP+GEM+ネシツムマブ（ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ）療法
診療科・対象疾患	（呼）切除不能・再発の扁平上皮非小細胞肺がん
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	4～6コース

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
シスプラチン	シスプラチン	75mg/㎡	day1
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1250mg/㎡	day1,8
ポートラーザ	ネシツムマブ	800mg/body	day1,8

治療内容

注射

滴下順	抗癌剤	薬剤（成分名）	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール day1	…	day8	…	…	…	day21
Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●						
Rp2		パロノセトロン0.75mg/50mL	1袋	15分	点滴静注メイン	●						
		デキサート6.6mg/2mL	1瓶									
		デキサート1.65mg/0.5mL	2管									
Rp3	癌	ポートラーザ800mg/50mL	800mg	60分	点滴静注メイン	●						
		生理食塩液	250mL									
Rp4		生理食塩液	50mL	全開	点滴静注メイン	●						
Rp5	癌	ゲムシタビン	1250mg/㎡	30分	点滴静注メイン	●						
		生理食塩液	100mL									
		総量100mLにする										
Rp6		ソリタT1号液	500mL	60分	点滴静注メイン	●						
		アスパラギン酸カリウム10mEq	1ｷｯﾄ									
		硫酸マグネシウム1mEq/mL	8mL									
Rp7		マンニットールS	300mL	30分	点滴静注メイン	●						
Rp8	癌	シスプラチン	75mg/㎡	60分	点滴静注メイン	●						
		生理食塩液	250mL									
		総量300mLにする										
Rp9		ソリタT1号液	500mL	60分	点滴静注メイン	●						
		アスパラギン酸カリウム10mEq	1ｷｯﾄ									

滴下順	抗癌剤	薬剤（成分名）	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール day1	…	day8	…	…	…	day21
Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用			●				
Rp2		生理食塩液	100mL	15分	点滴静注メイン			●				
		デキサート6.6mg/2mL	1瓶									
Rp3	癌	ポートラーザ800mg/50mL	800mg	60分	点滴静注メイン			●				
		生理食塩液	250mL									
Rp4		生理食塩液	50mL	全開	点滴静注メイン			●				
Rp5	癌	ゲムシタビン	1250mg/㎡	30分	点滴静注メイン			●				
		生理食塩液	100mL									
		総量100mLにする										
Rp6		生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン			●				
		硫酸マグネシウム1mEq/mL 20mL	8mL									

内服

その他必要薬剤	・アプレピタント125mg：1cap分1　ルートキープ時に内服(day1) ・アプレピタント80mg：1cap分1　朝食後に内服（day2,3） ・デカドロン（デキサメタゾン）4mg：2錠分1　朝食後に内服（day2～4）
総投与時間	day1：5時間30分 day8：2時間20分
血管外漏出リスク	ポートラーザ：非壊死性抗がん剤 ゲムシタビン：炎症性抗がん剤 シスプラチン：壊死性抗がん剤
投与時の注意事項	・day1は、シスプラチン投与開始前に水分（水、茶など）１０００mL摂取する。 ・ポートラーザ（ネシツムマブ）は、調製後、室温保存で4時間以内に投与を開始すること。
備考欄	＜ポートラーザ（ネシツムマブ）＞ ・皮膚障害（ざ瘡様皮疹、乾燥、爪囲炎等）が現れることがあるので、投与開始時よりミノサイクリンや保湿剤、ステロイド外用剤の予防投与を検討すること。 ・低マグネシウム血症が現れることがあるので、投与開始前、投与期間中、投与終了後は血清中電解質（マグネシウム、カルシウム、カリウム及びリン）をモニタリングすること。