がん化学療法指示書

登録番号 408
登録日 2024/9/30

レジメン名	ネシツムマブ維持療法
診療科・対象疾患	（呼）切除不能・再発の扁平上皮非小細胞肺がん
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ポートラーザ	ネシツムマブ	800mg/body	day1,8

		滴下順	抗癌剤	薬剤（成分名）	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール						
								day1	…	day8	…	…	…	day21
治療内容	注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●		●				
		Rp2	癌	ポートラーザ800mg/50mL	800mg	60分	点滴静注メイン	●		●				
				生理食塩液	250mL									
		Rp3		生理食塩液	50mL	全開	点滴静注メイン	●		●				
		Rp4		生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●		●				
				硫酸マグネシウム1mEq/mL	8mL									
	内服													
その他必要薬剤														
総投与時間		1時間45分												
血管外漏出リスク		ポートラーザ：非壊死性抗がん剤												
投与時の注意事項		・ポートラーザ（ネシツムマブ）は、調製後、室温保存で4時間以内に投与を開始すること。												
備考欄		＜ポートラーザ（ネシツムマブ）＞ ・皮膚障害（ざ瘡様皮疹、乾燥、爪囲炎等）が現れることがあるので、投与開始時よりミノサイクリンや保湿剤、ステロイド外用剤の予防投与を検討すること。 ・低マグネシウム血症が現れることがあるので、投与開始前、投与期間中、投与終了後は血清中電解質（マグネシウム、カルシウム、カリウム及びリン）をモニタリングすること。												