

化学療法指示書

登録番号 49

CBDCA + VP-16 3~4週毎 4コース

ID:				
氏名			指示者	
身長	cm	体重	kg	体表面積 m ²

・小細胞肺癌
・神経内分泌癌

血清Cr: mg/dl Ccr: ml/min(Cockcroft-Gault)

CBDCA (carboplatin、カルボプラチン) AUC 5 × (Ccr + 25) = ()mg/body day1
VP-16 (エトポシド) 80 (or.100) mg/m² = ()mg/body day1,2,3

コース目 月 日 (day 1)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

デキサート (6.6mg)	1 A
デキサート (1.65mg)	2 A
パロノセトロン注(0.75mg)	1 袋

15分

生理食塩液 250mL	
エトポシド ()mg	

60分

生理食塩液 250mL	
カルボプラチン ()mg	

60分

コース目 月 日 (day 2)、 月 日 (day 3)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

生理食塩液 100mL	
デキサート (6.6mg)	1 V

15分

生理食塩液 250mL	
エトポシド ()mg	

60分

◆ 嘔気時: (開始後28日目)まで適宜下記を投与

1) 生食100 mL + グラニセトロン(3 mg) 1A + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)
(1日に2回まで)

2) 生食100 mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(60分)
(1日に1回まで)

◆投与開始基準

1コース目 Day1	2コース目以降の day1
PS:0-2	PS:0-2
WBC \geq 4000 / μ L	WBC \geq 4000 / μ L
好中球 \geq 2000 / μ L	好中球 \geq 2000 / μ L
Hb \geq 9.5 g/dl	
Plt \geq 100000 / μ L	Plt \geq 100000 / μ L
AST \leq 95	AST \leq 95
ALT \leq 110	ALT \leq 110
感染を伴う38℃以上の発熱がない	感染を伴う38℃以上の発熱がない

◆化学療法の休止もしくは投与量変更の基準

血小板数、白血球数及び好中球数の最低値	CBDCA	ETOP
WBC < 1000 / μ L	変更なし	20mg/m ² ずつ減量
Plt < 20000 / μ L	変更なし	20mg/m ² ずつ減量
好中球数 < 1000 / μ L + 38℃以上の発熱	変更なし	20mg/m ² ずつ減量
血清クレアチニンが正常値の1.5倍以上(2.1mg/dl以上)	AUC4(or4.5)へ減量	変更なし