

# 化学療法指示書

登録番号 50

## CDDP + CPT-11 4週毎 4コース

ID:			
氏名		指示者	
身長	cm	体重	kg
		体表面積	m <sup>2</sup>

- ・小細胞肺癌
- ・神経内分泌癌

CDDP (cisplatin、シスプラチン) 60mg/m<sup>2</sup> = ( )mg/body day1

CPT-11 (irinotecan hydrochloride、イリノテカン塩酸塩) 60mg/m<sup>2</sup> = ( )mg/body day1,8,15

### ※内服薬

Day1: イメンド(125mg) 1cap ルート確保時に

Day2,3: イメンド(80mg) 1cap 朝食後

Day2~4: デカドロン4mg 2錠 朝食後

コース目 月 日 (day 1)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

パロノセトロン注(0.75mg) 1袋  
デキサート(6.6mg) 1A  
デキサート(1.65mg) 2A

15分

ルートキープ時に  
イメンド(125mg) 1cap内服

KN3号500mL  
硫酸マグネシウム補正液 8mL

90分

KN3号500mL

90分

生理食塩液 250mL  
イリノテカン ( )mg

60分

マンニトールS300mL

30分

フロセミド(20mg) 1A  
(マンニトールS終了後、i.v.)

生理食塩液 250mL  
シスプラチン ( )mg  
(全量250mLとする)

60分

生理食塩液 500mL

90分

KN3号500mL

90分

コース目 月 日(day 8)、 月 日(day 15)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

パロノセトロン注(0.75mg)	1 袋
デキサート (6.6mg)	1 A
デキサート (1.65mg)	2 A

15分

生理食塩液 250mL	
イリノテカン ( )mg	

60分

◆ 嘔気時:(開始後28日目)まで 適宜下記を投与

- 1) グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)  
(1日に2回まで)
- 2) 生食100 mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(60分)  
(1日に1回まで)

◆ 下痢時:(開始後28日目)まで 適宜下記を投与

- 1) ロペミン 3錠 分3 朝昼夕
- 2) リン酸コデイン100倍散 3g 分3 朝昼夕
- 3) タンナルビン 3g 分3 朝昼夕

◆ 投与開始基準

1 コース目 Day1	Day8, 15	2 コース目以降の day1
PS:0-1	PS:0-1	PS:0-1
WBC ≥ 4000 / μL	WBC ≥ 3000 / μL	WBC ≥ 3000 / μL
好中球 ≥ 2000 / μL	好中球 ≥ 1500 / μL	好中球 ≥ 1500 / μL
Hb ≥ 95 g/dl		
Plt ≥ 100000 / μL	Plt ≥ 75000 / μL	Plt ≥ 100000 / μL
AST ≤ 95	AST ≤ 95	AST ≤ 95
ALT ≤ 110	ALT ≤ 110	ALT ≤ 110
感染を伴う 38℃以上の発熱がない	感染を伴う 38℃以上の発熱がない	感染を伴う 38℃以上の発熱がない
開始 24 時間以内の下痢がない	開始 24 時間以内の下痢がない	開始 24 時間以内の下痢がない
血清クレアチニンが正常値以下		血清クレアチニンが正常値以下
肺毒性 CTC グレード 1 以下	肺毒性 CTC グレード 1 以下	肺毒性 CTC グレード 1 以下

◆ 化学療法の休止もしくは投与量変更の基準

血小板数、白血球数、及び好中球数の最低値	CDDP	CPT-11
WBC < 1000 / μL	変更なし	50mg/m <sup>2</sup> へ減量
Plt < 20000 / μL	変更なし	50mg/m <sup>2</sup> へ減量
好中球数 < 1000 / μL + 38℃以上の発熱	変更なし	50mg/m <sup>2</sup> へ減量
血清クレアチニンが正常値の 1.5 倍以上 (2.1mg/dl 以上)	60mg/dl へ減量	変更なし