

# 化学療法指示書

登録番号 52

## CDDP + VNB 3~4週毎 4~6コース

ID:			
氏名			指示者
身長	cm	体重	kg
		体表面積	m <sup>2</sup>


・非小細胞肺癌

CDDP (cisplatin、シスプラチン) 80mg/m<sup>2</sup>= ( )mg/body day1  
 VNB (vinorelbine、ロゼウス) 25mg/m<sup>2</sup>= ( )mg/body day1,8

### ※内服薬


Day1: アプレピタント125mg 1cap ルート確保時に  
 Day2,3: アプレピタント80mg 1cap 朝食後  
 Day2~4: デカドロン4mg 2錠 朝食後


コース目 月 日 (day 1)




コース目 月 日 (day 8)

生理食塩液100mL ルート確保・フラッシュ用

[ ]  
 グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 

[ ]  
 生理食塩液 50 mL  
 ロゼウス ( )mg 

[ ]  
 生理食塩液 100 mL 

◆ 嘔気時:(開始後28日目)まで 適宜下記を投与

- 1) グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋 + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)  
(1日に2回まで)
- 2) 生食100 mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10 mg)1A 点滴静注(60分)  
(1日に1回まで)

1 コース目 Day1	Day8	2 コース目以降の day1
PS:0-1	PS:0-1	PS:0-2
WBC $\geq$ 4000 / $\mu$ L	WBC $\geq$ 2000 / $\mu$ L	WBC $\geq$ 3000 / $\mu$ L
好中球 $\geq$ 2000 / $\mu$ L		好中球 $\geq$ 1500 / $\mu$ L
Hb $\geq$ 9.5 g/dl		
Plt $\geq$ 100000 / $\mu$ L	Plt $\geq$ 75000 / $\mu$ L	Plt $\geq$ 100000 / $\mu$ L
AST $\leq$ 95		AST $\leq$ 95
ALT $\leq$ 110		ALT $\leq$ 110
感染を伴う 38℃以上の発熱がない	感染を伴う 38℃以上の発熱がない	感染を伴う 38℃以上の発熱がない
血清クレアチニンが正常値以下		血清クレアチニンが正常値以下
肺毒性 CTC グレード1 以下	肺毒性 CTC グレード1 以下	肺毒性 CTC グレード1 以下

血小板数、白血球数及び好中球数の最低値	CDDP	VNR
WBC $<$ 1000 / $\mu$ L	変更なし	20mg/m <sup>2</sup> へ減量
Plt $<$ 20000 / $\mu$ L	変更なし	20mg/m <sup>2</sup> へ減量
好中球数 $<$ 1000 / $\mu$ L + 38℃以上の発熱	変更なし	20mg/m <sup>2</sup> へ減量
血清クレアチニンが正常値の1.5倍以上 (2.1mg/dl 以上)	60mg/dl へ減量	変更なし