

化学療法指示書

登録番号 54

CDDP + GEM 4週毎 4～6コース


ID:				
氏名			指示者	
身長	cm	体重	kg	体表面積
				m ²

・非小細胞肺癌

CDDP (cisplatin、シスプラチン) 80mg/m²= ()mg/body day1
 GEM (gemcitabine、ゲムシタビン) 1000mg/m²= ()mg/body day1,8

※内服薬
 Day1: アプレピタント(125mg) 1cap ルート確保時に
 Day2,3: アプレピタント(80mg) 1cap 朝食後
 Day2~4: デカドロン4mg 2錠 朝食後

コース目 月 日 (day 1)



コース目 月 日 (day 8)

生理食塩液100mL ルート確保・フラッシュ用

グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋
デキサート (6.6mg) 1 A

15分

生理食塩液 100mL
ゲムシタピン ()mg
(総量100mLに)

30分

◆ 嘔気時:(開始後28日目)まで 適宜下記を投与

- 1) グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)
(1日に2回まで)
- 2) 生食100 mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(60分)
(1日に1回まで)

◆ 投与開始基準

1 コース目 Day1	Day8	2 コース目以降の day1
PS:0-1	PS:0-1	PS:0-2
WBC ≥ 4000 / μL	WBC ≥ 2000 / μL	WBC ≥ 3000 / μL
好中球 ≥ 2000 / μL	好中球 ≥ 1000 / μL	好中球 ≥ 1500 / μL
Hb ≥ 9.5 g/dl		
Plt ≥ 100000 / μL	Plt ≥ 75000 / μL	Plt ≥ 100000 / μL
AST ≤ 95	AST ≤ 95	AST ≤ 95
ALT ≤ 110	ALT ≤ 110	ALT ≤ 110
感染を伴う 38℃以上の発熱がない	感染を伴う 38℃以上の発熱がない	感染を伴う 38℃以上の発熱がない
血清クレアチニンが正常値以下		血清クレアチニンが正常値以下
肺毒性 CTC グレード1 以下	肺毒性 CTC グレード1 以下	肺毒性 CTC グレード1 以下

◆ 化学療法の休止もしくは投与量変更の基準

血小板数、白血球数及び好中球数の最低値	CDDP	GEM
WBC < 1000 / μL	変更なし	800mg/m ² → 減量
Plt < 20000 / μL	変更なし	800mg/m ² → 減量
好中球数 < 1000 / μL + 38℃以上の発熱	変更なし	800mg/m ² → 減量
血清クレアチニンが正常値の 1.5 倍以上 (2.1mg/dl 以上)	60mg/dl → 減量	変更なし