

化学療法指示書

CBDCA + PTX 3~4週毎 4~6コース

登録番号 55

ID:		アルコール過敏症:	
氏名		指示者	
身長	cm	体重	kg
		体表面積	m ²


・非小細胞肺癌

血清Cr: mg/dl Ccr: ml/min(Cockcroft-Gault)

CBDCA(carboplatin、カルボプラチン) AUC 5 (or 6) × (Ccr + 25) = ()mg/body day1
 PTX(paclitaxel、パクリタキセル) 180 (or 200)mg/m² = ()mg/body day1

コース目 月 日 (day 1)

* PVCフリー・フィルター付きの輸液セットを使用すること



- ◆ 嘔気時:(開始後28日目)まで適宜下記を投与
- 1) グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)
(1日に2回まで)
 - 2) 生食100 mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(60分)
(1日に1回まで)

◆投与開始基準

1コース目 Day1	2コース目以降の day1
PS:0-1	PS:0-2
WBC \geq 4000 / μ L	WBC \geq 3000 / μ L
好中球 \geq 2000 / μ L	好中球 \geq 1500 / μ L
Hb \geq 9.5 g/dl	
Plt \geq 100000 / μ L	Plt \geq 100000 / μ L
AST \leq 95	AST \leq 95
ALT \leq 110	ALT \leq 110
感染を伴う38℃以上の発熱がない	感染を伴う38℃以上の発熱がない
血清クレアチニンが正常値以下	血清クレアチニンが正常値以下
肺毒性 CTC グレード1以下	肺毒性 CTC グレード1以下

◆化学療法の休止もしくは投与量変更の基準

血小板数、白血球数及び好中球数の最低値	CBDCA	PTX
WBC $<$ 1000 / μ L	変更なし	135 (or 150)mg/m ² へ減量
Plt $<$ 20000 / μ L	AUC 4 (or 4.5)へ減量	変更なし
好中球数 $<$ 1000 / μ L+38℃以上の発熱	変更なし	135 (or 150)mg/m ² へ減量
血清クレアチニンが正常値の1.5倍以上 (2.1mg/dl 以上)	AUC 4 (or 4.5)へ減量	変更なし