

化学療法指示書

登録番号 57


DTX 3週毎 投与コース数:基準なし、効果と副作用で決める

ID:				
氏名			指示者	
身長	cm	体重	kg	体表面積 m ²

・非小細胞肺癌

DTX(docetaxel、ドセタキセル) 60mg/m²= ()mg/body day1

コース目 月 日(day 1)



◆ 嘔気時: (開始後28日目)まで適宜下記を投与

- 1) グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋+エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)
(1日に2回まで)
- 2) 生食100 mL+デキサート(6.6mg) 1A+エリーテン(10 mg)1A 点滴静注(60分)
(1日に1回まで)

◆ 投与開始基準

第1 コース day1 開始基準	第2 コース day1 開始基準
PS:0-1	PS:0-1
WBC \geq 4000 / μ L	WBC \geq 4000 / μ L
好中球 \geq 2000 / μ L	好中球 \geq 2000 / μ L
Hb \geq 9.5 g/dl	
Plt \geq 100000 / μ L	Plt \geq 100000 / μ L
AST \leq 95	AST \leq 95
ALT \leq 110	ALT \leq 110
感染を伴う 38℃以上の発熱がない	感染を伴う 38℃以上の発熱がない