

化学療法指示書

登録番号 60

Weekly PTX 3~4週毎 投与コース数:基準なし、効果と副作用で決める

ID:		アルコール過敏:	
氏名			指示者
身長	cm	体重	kg
		体表面積	m ²

・非小細胞肺癌

PTX (paclitaxel、パクリタキセル) 80 mg/m² = () mg/body day1,8

* PVCフリー・フィルター付きの輸液セットを使用すること

コース目 月 日 (day 1) 月 日 (day 8)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

生理食塩液 100 mL	
デキサート(6.6mg)	2 A
デキサート(1.65mg)	2 A
ファモチジン(20mg)	1 A

30分

この間に
レスタミンコーワ(10mg) 5錠 内服

グラニセロン注(3mg/50mL) 1袋

15分

生理食塩液 250 mL	
パクリタキセル ()mg	

60分

◆ 嘔気時: (開始後28日目)まで適宜下記投与

- 1) グラニセロン注(3mg/50mL)1袋+エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)
(1日に2回まで)
- 2) 生食100 mL+デキサート(6.6mg) 1A+エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(60分)
(1日に1回まで)

◆ 投与開始基準

1 コース目 Day1	Day8	2 コース目以降の day1
PS:0-1	PS:0-1	PS:0-1
WBC ≥ 4000 / μL	WBC ≥ 2000 / μL	WBC ≥ 3000 / μL
好中球 ≥ 2000 / μL		好中球 ≥ 1500 / μL
Hb ≥ 9.5 g/dl		
Plt ≥ 100000 / μL	Plt ≥ 75000 / μL	Plt ≥ 100000 / μL
AST ≤ 95	AST ≤ 95	AST ≤ 95
ALT ≤ 110	ALT ≤ 110	ALT ≤ 110
感染を伴う38°C以上の発熱がない	感染を伴う38°C以上の発熱がない	感染を伴う38°C以上の発熱がない