

患者名 様
ID

レジメン名 リツキシマブ単剤(導入)

治療日

ChemoNavi		治療内容																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <th style="width: 30%;">薬品名※()は成分名</th> <th style="width: 30%;">投与量</th> <th style="width: 40%;">投与日</th> </tr> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> </table>	薬品名※()は成分名	投与量	投与日	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">投与サイクル数</td> <td>4サイクル</td> </tr> <tr> <td>総投与時間</td> <td>A設定: 約4時間 B設定: 約3時間</td> </tr> <tr> <td>血管外漏出リスク</td> <td>リツキシマブ: 不明</td> </tr> <tr> <td>その他必要薬剤</td> <td>ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠</td> </tr> <tr> <td>投与時の注意事項</td> <td> ・day1: リツキシマブによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服 </td> </tr> <tr> <td>備考欄</td> <td></td> </tr> </table>	投与サイクル数	4サイクル	総投与時間	A設定: 約4時間 B設定: 約3時間	血管外漏出リスク	リツキシマブ: 不明	その他必要薬剤	ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠	投与時の注意事項	・day1: リツキシマブによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服	備考欄		<p>day1</p> <p>* 内服</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">A設定</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>B設定</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <p>* 点滴</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">A設定</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">B設定</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 A設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50ml/h ↓ (30分) 250ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100ml/h ↓ (30分) 300ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150ml/h ↓ (30分) 350ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200ml/h ↓ (30分) 400ml/h</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 B設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">400ml/h</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">A設定</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>B設定</td> <td></td> </tr> </table>	A設定		B設定		A設定	B設定	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 A設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50ml/h ↓ (30分) 250ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100ml/h ↓ (30分) 300ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150ml/h ↓ (30分) 350ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200ml/h ↓ (30分) 400ml/h</td> <td></td> </tr> </table>	② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用		↓		③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分		↓		④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 A設定		-----		50ml/h ↓ (30分) 250ml/h		↓ (30分)		100ml/h ↓ (30分) 300ml/h		↓ (30分)		150ml/h ↓ (30分) 350ml/h		↓ (30分)		200ml/h ↓ (30分) 400ml/h		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 B設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">400ml/h</td> <td></td> </tr> </table>	② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用		↓		③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分		↓		④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 B設定		-----		100ml/h (30分)		↓		200ml/h (30分)		↓		300ml/h (30分)		↓		400ml/h	
薬品名※()は成分名	投与量	投与日																																																																																
リツキシマブ	375mg/m ²	day1																																																																																
投与サイクル数	4サイクル																																																																																	
総投与時間	A設定: 約4時間 B設定: 約3時間																																																																																	
血管外漏出リスク	リツキシマブ: 不明																																																																																	
その他必要薬剤	ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠																																																																																	
投与時の注意事項	・day1: リツキシマブによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服																																																																																	
備考欄																																																																																		
① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">A設定</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>B設定</td> <td></td> </tr> </table>	A設定		B設定																																																																														
A設定																																																																																		
B設定																																																																																		
A設定	B設定																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 A設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50ml/h ↓ (30分) 250ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100ml/h ↓ (30分) 300ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150ml/h ↓ (30分) 350ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓ (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200ml/h ↓ (30分) 400ml/h</td> <td></td> </tr> </table>	② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用		↓		③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分		↓		④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 A設定		-----		50ml/h ↓ (30分) 250ml/h		↓ (30分)		100ml/h ↓ (30分) 300ml/h		↓ (30分)		150ml/h ↓ (30分) 350ml/h		↓ (30分)		200ml/h ↓ (30分) 400ml/h		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 B設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300ml/h (30分)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">400ml/h</td> <td></td> </tr> </table>	② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用		↓		③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分		↓		④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 B設定		-----		100ml/h (30分)		↓		200ml/h (30分)		↓		300ml/h (30分)		↓		400ml/h																														
② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用																																																																																		
↓																																																																																		
③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分																																																																																		
↓																																																																																		
④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 A設定																																																																																		

50ml/h ↓ (30分) 250ml/h																																																																																		
↓ (30分)																																																																																		
100ml/h ↓ (30分) 300ml/h																																																																																		
↓ (30分)																																																																																		
150ml/h ↓ (30分) 350ml/h																																																																																		
↓ (30分)																																																																																		
200ml/h ↓ (30分) 400ml/h																																																																																		
② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用																																																																																		
↓																																																																																		
③ 生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分																																																																																		
↓																																																																																		
④ 生理食塩液 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 B設定																																																																																		

100ml/h (30分)																																																																																		
↓																																																																																		
200ml/h (30分)																																																																																		
↓																																																																																		
300ml/h (30分)																																																																																		
↓																																																																																		
400ml/h																																																																																		

投与スケジュール

今回は 1 2 3 4 サイクル

リツキシマブ単剤(導入)

治療日	1	2	3	4	5	6	7
リツキシマブ	●						

