

治療日: 月 日

今回( )サイクル目

# 化学療法指示書


登録番号 63

## XELOX + Bmab 療法

ID:				
氏名			指示者	
身長	cm	体重	kg	体表面積
				m <sup>2</sup>

・進行再発大腸

### 投与スケジュール



21日毎(7日休薬)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

本体①		
パロノセトロン注(0.75mg)	1 袋	
デキサート(6.6mg)	1 V	

15分

### ゼロータ投与量 (C法)

本体②		
生理食塩液100mL	1 V	
ベバシズマブBS (総量100mLにする)	mg	(7.5mg/kg)

1回目	:90分
2回目	:60分
3回目以降	:30分

体表面積(m <sup>2</sup> )	1回投与量
1.36未満	1200mg
1.36以上 1.66未満	1500mg
1.66以上 1.96未満	1800mg
1.96以上	2100mg

《ベバシズマブBS終了後、フラッシュ》

生理食塩液50mL 1 V

ベバシズマブBS  
と同じ投与速度

本体③		
5%ブドウ糖250mL	1 V	
デキサート(1.65mg)	1 A	
オキサリプラチン (130mg/m <sup>2</sup> )	mg	

120分

	1段階減量	2段階減量
オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	75mg/m <sup>2</sup>

朝、夕食後30分以内に1日2回  
内服 (day1 夕食後から内服開始)