

◆化学療法の休止もしくは投与量変更の基準

治療開始時基準	Day8以降の化学療法休止及び投与量変更基準		
	当日の毒性	カルボプラチン	パクリタキセル
PS:0-1	2000≤WBC<3000	AUC 2	30 mg/m ²
WBC≥4000	WBC<2000	Skip	Skip
好中球≥2000	50000≤Plt<75000	AUC 1.5	40 mg/m ²
Hb≥9.5	Plt<50000	Skip	Skip
Plt≥100000	Grade 3以上のその他の	Skip	Skip
AST≤100, ALT≤112	非血液毒性(悪心・嘔吐は除く)		
感染を伴う38度以上の発熱がない	放射線治療が中断されている場合	Skip	Skip

◆放射線療法の延期と再開基準

	延期基準	再開基準
白血球減少	Grade 4	Grade 2以下に回復
好中球減少	Grade 4	Grade 2以下に回復
血小板減少	20000未満	Grade 2以下に回復
発熱	38度以上 (感染症や肺炎が否定されれば続行)	37度以下または平熱への回復
食道炎	Grade 3以上	Grade 2以下に回復
皮膚炎	Grade 3以上	Grade 2以下に回復
肺炎	PaO ₂ が60torr以下、もしくは肺炎の徴候がみられた場合	明らかな肺炎症例は治療再開はしない