

◆投与開始基準

1 コース目 Day1
PS:0-1
WBC \geq 4000 / μ L
好中球 \geq 1500 / μ L
Hb \geq 9.0 g/dl
Plt \geq 100000 / μ L
総ビリルビン \leq 1.8mg/dl
AST \leq 95
ALT \leq 110
感染を伴う38℃以上の発熱がない
クレアチンクリアランス \geq 60ml/min

◆休薬・再開基準

休薬	再開
WBC \leq 2000 / μ L	WBC \geq 2000 / μ L
好中球 \leq 1000 / μ L	好中球 \geq 1000 / μ L
Plt \leq 50000 / μ L	Plt \geq 750000 / μ L
発熱性好中球減少 (WBC \leq 1000 / μ L+発熱 38.5℃以上)	発熱性好中球減少 (WBC \geq 1500 / μ L+平熱化)
総ビリルビン \geq 1.8mg/dl	総ビリルビン \leq 1.5mg/dl
AST \geq 95	AST \leq 95
ALT \geq 110	ALT \leq 110
クレアチンクリアランス $<$ 60ml/min	クレアチンクリアランス \geq 60ml/min
下痢 Grade2以上 * 1	下痢 Grade1 以下 * 1
口内炎 Grade2以上 * 2	口内炎 Grade1 以下 * 2

- * 1:治療前に比べ4回以上の排便回数の増加、静脈内輸液を要する
 * 2:症状があるが、食べやすく加工した食事を摂取し嚥下することはできる

◆次コース投与量変更の基準

WBC、好中球、Plt Grade4	CBDCA	TS-1
発熱性好中球減少	AUC 5 から 4 へ減量	60mg/回 \Rightarrow 50mg/回
総ビリルビン \geq 1.8mg/dl		50mg/回 \Rightarrow 40mg/回
95 \leq AST \leq 190、110 \leq AST \leq 220 * 3		40mg/回 \Rightarrow 25mg/回
クレアチンクリアランス $<$ 60ml/min		
下痢 Grade3以上 * 4		
口内炎 Grade3以上 * 5		

- * 3:AST \geq 190、ALT \geq 220は次コース投与薬剤変更へ
 * 4:治療前に比べ7回以上の排便回数の増加:便失禁; \geq 24時間の静脈内輸液を要する;入院を要する;生命を脅かす
 * 5:症状があり、十分な栄養や水分の経口摂取ができない