

治療日: 月 日 今回( )

サイクル目

# 化学療法指示書


登録番号 89

|     |    |    |     |                |
|-----|----|----|-----|----------------|
| ID: |    |    |     |                |
| 氏名  |    |    | 指示者 |                |
| 身長  | cm | 体重 | kg  | 体表面積           |
|     |    |    |     | m <sup>2</sup> |

・進行・再発胃癌

HER2陽性  
(IHC:3+および  
IHC:2+/FISH陽性  
( $\geq 2.0$ ))

## 投与スケジュール



Day 1: 月 日

側管①  
生理食塩液500ml 1 V  
オクローラミド 1 A

120分

生理食塩液 100mL  
ルートキープ・フラッシュ用

内服薬 Day1  
イメドカプセル125mg 1cap  
シスプラチン投与1時間前に内服

側管②  
KN3号 500mL 1 V  
オクローラミド 1 A

180分

本体②  
パロノセトロン注(0.75mg) 1 袋  
デキサート 6.6mg 1 V  
デキサート 1.65mg 2 A

(注)  
(初回のみ:8mg/kg)  
生理食塩液250mL 1 V  
トラスツズマブBS \_\_\_\_\_ mg  
90分

側管③  
KN3号 500mL 1 V  
オクローラミド 1 A

180分

1回目 90分  
2回目~ 30分  
本体③ \*  
生理食塩液250mL 1 V  
トラスツズマブBS \_\_\_\_\_ mg  
(6mg/kg)

\*トラスツズマブBS  
初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる

### ゼロータ投与量 (C法)

| 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 1回投与量  |
|-----------------------|--------|
| 1.36未満                | 1200mg |
| 1.36以上<br>1.66未満      | 1500mg |
| 1.66以上<br>1.96未満      | 1800mg |
| 1.96以上                | 2100mg |

本体④  
生理食塩液500mL 1 V  
シスプラチン \_\_\_\_\_ mg  
(80mg/m<sup>2</sup>) (総量500mLに)

180分

本体⑤  
KN3号 500mL 1 V  
フロセミド(20mg) 1 A  
デキサート(6.6mg) 1 A

120分

朝、夕食後30分以内に1日2回内服  
(Day1夕食後から内服開始)

Day 2: 月 日

KN3号500mL 1 V  
オクローラミド 1 A

90分

内服薬 Day2から  
デカドロン4mg 2錠×3日間  
イメドカプセル80mg 1cap×2日間

KN3号500mL 1 V  
オクローラミド 1 A  
フロセミド(20mg) 0.5 A

90分