

レジメン名 AZA療法 対象疾患 骨髄異形症候群・急性骨髄性白血病

ChemoNavi			治療内容 day1-7																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名※()は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アザシチジン</td> <td>75mg/m²</td> <td>day1-7</td> </tr> </tbody> </table>	薬品名※()は成分名	投与量	投与日	アザシチジン	75mg/m ²	day1-7	<table border="1"> <tr> <td>投与サイクル数</td> <td>PDまで</td> </tr> <tr> <td>総投与時間</td> <td>15分</td> </tr> <tr> <td>血管外漏出リスク</td> <td>非壊死性抗がん剤</td> </tr> </table>	投与サイクル数	PDまで	総投与時間	15分	血管外漏出リスク	非壊死性抗がん剤	<div style="text-align: center;"> <p>① 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 全開</p> <p>↓</p> <p>③ アザシチジン mg 蒸留水 ml 生理食塩液 50 ml 点滴、10分</p> </div>																	
薬品名※()は成分名	投与量	投与日																													
アザシチジン	75mg/m ²	day1-7																													
投与サイクル数	PDまで																														
総投与時間	15分																														
血管外漏出リスク	非壊死性抗がん剤																														
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アザシチジン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	治療日	1	2	3	4	5	6	7	28	アザシチジン	●	●	●	●	●	●	●						<table border="1"> <tr> <td>投与時の注意事項</td> <td>アザシチジンは調製から1時間以内に、投与を終了すること。</td> </tr> <tr> <td>備考欄</td> <td></td> </tr> </table>	投与時の注意事項	アザシチジンは調製から1時間以内に、投与を終了すること。	備考欄	
治療日	1	2	3	4	5	6	7	28																			
アザシチジン	●	●	●	●	●	●	●																								
投与時の注意事項	アザシチジンは調製から1時間以内に、投与を終了すること。																														
備考欄																															