

治療日: 月 日

今回()サイクル目

化学療法指示書

登録番号 92

CPT-11 3(4)週毎

ID:					
氏名			指示者		
身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²

・小細胞肺癌
・神経内分泌癌

CPT-11 (irinotecan hydrochloride、イリノテカン塩酸塩) 100mg/m² = ()mg/body day1,8

※内服薬

Day2~4: デカドロン4mg 2錠 朝食後
Day9~11: デカドロン4mg 2錠 朝食後

コース目 月 日 (day 1)、 月 日 (day 8)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋
デキサート (6.6mg) 1 A
デキサート (1.65mg) 2 A

15分

生理食塩液 500mL 1 V
イリノテカン ()mg

90分

◆ 嘔気時

- 1) グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋 + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)
(1日に2回まで)
- 2) 生食100 mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(60分)
(1日に1回まで)
- 3) 上記無効時には、セレネース(1mg)3錠 分3 又は コンスタン(0.4mg)3錠 分3 又は
ノバミン(5mg)3錠 分3なども検討

◆ 下痢時: 月 日 (開始後28日目)まで 適宜下記を投与

- 1) ロペミン 3カプセル 分3 朝昼夕
- 2) リン酸コデイン100倍散 3g 分3 朝昼夕
- 3) タンナルビン 3g 分3 朝昼夕

◆投与開始基準

1コース目 Day1	Day8	2コース目以降の day1
PS:0-1	PS:0-1	PS:0-1
WBC \geq 4000/ μ L	WBC \geq 3000/ μ L	WBC \geq 3000/ μ L
好中球 \geq 2000/ μ L		好中球 \geq 2000/ μ L
Hb \geq 95g/dl		
Plt \geq 100000/ μ L	Plt \geq 100000/ μ L	Plt \geq 100000/ μ L
AST \leq 95	AST \leq 95	AST \leq 95
ALT \leq 110	ALT \leq 110	ALT \leq 110
感染を伴う38℃以上の発熱がない	感染を伴う38℃以上の発熱がない	感染を伴う38℃以上の発熱がない
開始24時間以内の下痢がない	開始24時間以内の下痢がない	開始24時間以内の下痢がない

◆化学療法の休止もしくは投与量変更の基準

血小板数、白血球数、及び好中球数の最低値	CPT-11
WBC $<$ 1000/ μ L	50mg/m ² へ減量
Plt $<$ 20000/ μ L	50mg/m ² へ減量
好中球数 $<$ 1000/ μ L+38℃以上の発熱	50mg/m ² へ減量