

治療日: 月 日

今回( )サイクル目

# 化学療法指示書

登録番号 97

## ノギテカン 療法

ID:					
氏名			指示者		
身長	cm	体重	kg	体表面積	m <sup>2</sup>

がん化学療法後  
に増悪した  
卵巣癌  
小細胞肺癌

### 投与スケジュール

Day 1 2 3 4 5 ... 22

ノギテカン塩酸塩  
(小細胞肺癌: 1.0mg/m<sup>2</sup>)  
(卵巣癌: 1.5mg/m<sup>2</sup>)



5日投薬、16日休薬

卵巣癌  
(前治療、プラチナ製剤使用の場合、1.25mg/m<sup>2</sup>)

生理食塩液100mL ルート確保・フラッシュ用

本体①  
生理食塩液100mL 1 V  
デキサート注射液(6.6mg) 1 V

15分

本体②  
生理食塩液100mL 1 V  
ハイカムチン注射用1.1mg \_\_\_\_\_ mg  
( 1.0 ・ 1.5 mg/m<sup>2</sup>)

30分

## 用法・用量に関する使用上の注意

### がん化学療法後に増悪した卵巣癌

#### 減量の目安

初回投与量	1.5 mg/m <sup>2</sup> /day
1段階減量	1.25 mg/m <sup>2</sup> /day
2段階減量	1.0 mg/m <sup>2</sup> /day

前治療、プラチナ製剤使用の場合、1.25mg/m<sup>2</sup>/day減量  
さらにリスク因子がある場合、1.0mg/m<sup>2</sup>/dayに減量

### 小細胞肺癌

#### 増減量の目安

1段階増量	1.2 mg/m <sup>2</sup> /day
初回投与量	1.0 mg/m <sup>2</sup> /day
1段階減量	0.8 mg/m <sup>2</sup> /day

### 腎障害患者

クレアチニンクリアランス	20~39	mL/分
初回投与量	通常用量の半量	