

# がん薬物療法(全般)



## 服薬情報提供書(大阪版)

処方医	科	先生	保険	名称	
患者ID			薬局	住所	
患者名				TEL	
				FAX	
患者同意	<input type="checkbox"/> 同意を得た。	<input type="checkbox"/> 同意は得ていないが、治療上重要と考えるため報告します。		担当薬剤師	

確認日	年	月	日	対応者	<input type="checkbox"/> 本人	<input type="checkbox"/> 家族	<input type="checkbox"/> その他 ( )
レジメン・薬剤名				確認方法	<input type="checkbox"/> 投薬時	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> テレフォンフォロー時
							<input type="checkbox"/> 患者からの問合せ時

発熱 (37.5度以上)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	呼吸困難、息切れ、咳嗽	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
感染症様症状 (喉の痛み、排尿時痛など)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり	重篤な出血 (消化管出血・血尿・咯血など)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり

受診勧奨の実施  なし  あり →  上記症状のため  Grade3以上のため  休薬が必要と思われたため

(※) 皮膚科・腫瘍内科コンセンサス会議 重症度評価

有害事象 [CTCAE v 5.0]	Grade1 (軽症*)	Grade2 (中等症*)	Grade3 (重症*)
下痢	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> ベースラインと比べて4回/日の排便回数増加;ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度増加	<input type="checkbox"/> 7回/日以上排便回数増加;入院を要する;人工肛門からの排泄量の高度増加;身の回りの日常生活動作の制限
便秘	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 不定期または間欠的な症状;便軟化薬/緩下剤/食事の工夫/浣腸を不定期に使用	<input type="checkbox"/> 緩下薬または浣腸の定期的な使用を要する持続的な症状;身の回りの日常生活動作の制限
悪心	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 摂食習慣に影響のない食欲低下	<input type="checkbox"/> 顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少
嘔吐	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 治療を要さない	<input type="checkbox"/> 外来での静脈内栄養を要する;内科的治療を要する
食欲不振	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 摂食習慣の変化を伴わない食欲低下	<input type="checkbox"/> 顕著な体重減少または栄養失調を伴う(例:カロリーや水分の経口摂取が不十分); 静脈内輸液/経管栄養/TPN 要する
口腔粘膜炎	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 症状がない、または軽度の症状;治療を要さない	<input type="checkbox"/> 経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍;経口栄養剤による補充を要する
末梢神経障害 (末梢性ニューロパチ)	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 症状がない(臨床所見または検査所見のみ)	<input type="checkbox"/> 中等度の症状;身の回りの日常生活動作の制限
倦怠感	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> だるさがある、または元気がない	<input type="checkbox"/> 身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある、または元気がない状態
高血圧 :成人	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 収縮期血圧(sBP)120-139 mmHgまたは拡張期血圧(dBP)80-89 mmHg	<input type="checkbox"/> sBP140-159またはdBP90-99;内科的治療の変更;症状を伴うdBP>20の上昇;単剤の薬物治療を要する
手足症候群 <sup>(※)</sup>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 手掌、足底に違和感があり、発赤はないが、わずかに見られ、疼痛はなく、日常生活の作業に差し支えない	<input type="checkbox"/> 手掌、足底に発赤、水疱形成がみられ、疼痛を時に感じ、日常生活の差表、歩行に差し支えることがある
ざ瘡様皮疹 <sup>(※)</sup>	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 顔面を中心に全体で20個前後の丘疹、膿疱を認める。疼痛、そう痒はない。日常生活は気にならない	<input type="checkbox"/> 顔面、躯幹に全体で50個前後の丘疹、膿疱を認める。疼痛、そう痒を時に感じ。症状について他人から指摘される
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

疼痛(部位・NRS・コントロールの状況など)、症状の詳細、指導内容、提案事項、その他

病院記載欄	返信日	年	月	日
<input type="checkbox"/> 報告内容を確認しました。	<input type="checkbox"/> 報告内容を確認し、処方医へ報告しました。			
<input type="checkbox"/> 提案内容を医師へ伝えました。	<input type="checkbox"/> 次回受診時・診察前面談時に検討します。	病院名		
<input type="checkbox"/> その他 ( )		薬剤師		

参考

【 1枚目のみ送信してください 】

味覚異常	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	食生活の変化を伴わない味覚変化	<input type="checkbox"/>	食生活の変化を伴う味覚変化(例：経口サプリメント);不快な味;味の消失		
皮膚乾燥 (※)	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	わずかな乾燥と鱗屑がみられる。そう痒はないか、軽症	<input type="checkbox"/>	乾燥と鱗屑が明らかにみられる。そう痒は軽症か、中等症	<input type="checkbox"/>	乾燥が著明で鱗屑が多量にみられる。そう痒は中等症か、重症
そう痒 (※)	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	時にむずむずするが、掻くほどではない。掻かなくとも眠れる	<input type="checkbox"/>	時に手がゆき、人前でも掻く。痒くて目が覚めることがある	<input type="checkbox"/>	かなり痒く、ほぼ常に掻いている。そう痒で眠れないことが多い
爪囲炎 (※)	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	軽度の発赤、腫脹がある。疼痛はなく、日常生活に差し支えない	<input type="checkbox"/>	発赤、腫脹がみられ、疼痛を時に感じ、日常生活の作業に差し支えることがある	<input type="checkbox"/>	発赤、腫脹が著明で、疼痛が常に強く、時に血管拡張性肉芽腫を生じ、日常生活の作業が行いづらく、歩行しづらい
皮疹 (斑状丘疹状皮疹)	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	症状の有無は問わない(例：そう痒、熱感、ひきつれ);体表面積(BSA)<10%を占める斑状疹/丘疹	<input type="checkbox"/>	症状の有無問わない, BSA10-30%の斑状疹/丘疹;身の回り以外の日常生活動作の制限;BSA> 30%を占める皮疹	<input type="checkbox"/>	中等度/高度の症状を伴う, BSA> 30%を占める斑状疹/丘疹;身の回りの日常生活動作の制限
蕁麻疹	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	体表面積(BSA)<10%を占める蕁麻疹;局所治療を要する	<input type="checkbox"/>	BSA10-30%を占める蕁麻疹;内服治療を要する	<input type="checkbox"/>	BSAの> 30%を占める蕁麻疹; 静脈内投与による治療を要する
湿疹	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	症状がない, または軽度の症状; ベースラインを超える内科的治療の追加を要さない	<input type="checkbox"/>	中等度; 外用薬または内服治療を要する;ベースラインを超える内科的治療の追加を要する	<input type="checkbox"/>	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 静脈内投与による治療を要する
浮腫 (全身性浮腫)	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	診察で明らか; 1+の圧痕浮腫	<input type="checkbox"/>	身の回り以外の日常生活動作に支障がある; 内服治療を要する	<input type="checkbox"/>	身の回りの日常生活動作に支障がある;静脈内投与による治療を要する; 皮膚の離開
疲労	<input type="checkbox"/>	なし	<input type="checkbox"/>	休息により軽快する疲労	<input type="checkbox"/>	休息によって軽快しない疲労; 身の回り以外の日常生活動作の制限	<input type="checkbox"/>	休息によって軽快しない疲労で, 身の回りの日常生活動作の制限を要する